

## KARTA PACIENTA



Dabigatran Etexilate Viatris 150 mg tvrdé kapsuly

- Túto kartu máte mať/má mať opatrovateľ neustále pri sebe
- Vždy sa uistite, či máte aktuálnu verziu

### **Vážená pacientka/vážený pacient/vážený opatrovateľ detského pacienta,**

váš lekár/lekár vášho dieťaťa začal liečbu liekom Dabigatran Etexilate Viatris. Aby bolo užívanie lieku Dabigatran Etexilate Viatris bezpečné, venujte, prosím, pozornosť dôležitým informáciám v písomnej informácii pre používateľa.

Keďže táto karta pre pacienta obsahuje dôležité informácie o vašej liečbe/liečbe vášho dieťaťa, túto kartu máte mať/má vaše dieťa mať vždy pri sebe, aby bol odborný zdravotnícky personál informovaný o tom, že užívate/vaše dieťa užíva Dabigatran Etexilate Viatris.

### **Informácie pre pacientov/opatrovateľov detských pacientov pre Dabigatran Etexilate Viatris**

O vašej liečbe/liečbe vášho dieťaťa

- Dabigatran Etexilate Viatris riedi krv. Používa sa na liečbu existujúcich krvných zrazenín alebo na zabránenie tvorby nebezpečných krvných zrazenín.
- Pri užívaní lieku Dabigatran Etexilate Viatris sa riadte pokynmi svojho lekára/lekára vášho dieťaťa. Nikdy nevynechajte dávku a neprestaňte užívať Dabigatran Etexilate Viatris bez konzultácie so svojím lekárom/lekárom vášho dieťaťa.
- Informujte svojho lekára/lekára vášho dieťaťa o všetkých aktuálne užívaných liekoch.
- Pred každým chirurgickým/invazívnym zákrokom informujte svojho lekára/lekára vášho dieťaťa o užívaní lieku Dabigatran Etexilate Viatris.
- Kapsuly Dabigatran Etexilate Viatris sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Kapsula sa má prehltnúť celá a zapíť pohárom vody. Kapsula sa nesmie lámať ani hrýzť a nesmú sa vyprázdňovať pelety z kapsuly.

Kedy požiadať o radu lekára

- Užívanie lieku Dabigatran Etexilate Viatris môže zvýšiť riziko krvácania. Ihneď sa obráťte na svojho lekára/lekára vášho dieťaťa, ak sa u vás/vášho dieťaťa vyskytne niektorý z nasledujúcich možných prejavov a príznakov krvácania, ako je: opuch, pocit nepohody, neobvyklá bolesť alebo bolesť hlavy, závrat, bledosť, slabosť, nezvyčajné modriny, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, neobvyklé dlhotrvajúce krvácanie po porezaní, nezvyčajné menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, krv

v moči, ktorý môže byť ružový alebo hnedý, červená/čierna stolica, vykašliavanie krvi, vracanie krvi alebo látky podobnej usadenine z kávy.

- V prípade pádu alebo zranenia, najmä ak je udretá hlava, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak pocítite/vaše dieťa pocíti pálenie záhy, nevoľnosť, vraciate/vracia, pocítite/pocíti žalúdočné ťažkosti, nadúvanie alebo bolesť v hornej časti brucha, neprestaňte užívať/podávať Dabigatran Etxilate Viatris bez konzultácie so svojim lekárom/lekárom vášho dieťaťa.

### **Informácie pre zdravotníckych pracovníkov pre Dabigatran Etxilate Viatris**

- Dabigatran Etxilate Viatris je perorálne antikoagulancium (priamy inhibítor trombínu).
- Pred chirurgickým alebo iným invazívnym zákrokom môže byť potrebné ukončiť liečbu liekom Dabigatran Etxilate Viatris.
- V prípadoch závažných príhod krvácania sa musí liečba liekom Dabigatran Etxilate Viatris okamžite prerušiť.
- Pre dospelých pacientov je k dispozícii špecifické antidotum idarucizumab. Účinnosť a bezpečnosť špecifického antidota idarucizumabu neboli u pediatrických pacientov stanovené.
- Podrobné informácie a viac odporúčaní o zvrátení antikoagulačného účinku lieku Dabigatran Etxilate Viatris nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku Dabigatran Etxilate Viatris a idarucizumabu.
- Dabigatran Etxilate Viatris sa vylučuje hlavne obličkami. Musí sa udržiavať adekvátne diuréza. Dabigatran Etxilate Viatris môže byť dialyzovaný.

**Prosím, vyplňte túto časť karty alebo požiadajte o to svojho lekára/lekára vášho dieťaťa.**

#### **Informácie o pacientovi**

Meno pacienta

Dátum narodenia

Indikácia antikoagulačnej liečby

Dávka lieku Dabigatran Etxilate Viatris

Kontakt na držiteľa je uvedený v písomnej informácii pre používateľa lieku Dabigatran Etxilate Viatris.

75100756  
3367334