

Písomná informácia pre používateľa

Peroxid vodíka 3 % dermálny a orálny roztok

peroxid vodíka

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Peroxid vodíka 3 % a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Peroxid vodíka 3 %
3. Ako používať Peroxid vodíka 3 %
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Peroxid vodíka 3 %
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Peroxid vodíka 3 % a na čo sa používa

Peroxid vodíka 3% je zriedený roztok peroxidu vodíka, ktorý je určený na:

- dermálne použitie (t. j. na kožu): čistenie rán a vredov,
- orálne použitie (t. j. do ústnej dutiny): výplachy ústnej dutiny pri zápale sliznice ústnej dutiny alebo zápale ďasien alebo ako kloktadlo.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Peroxid vodíka 3 %

Nepoužívajte Peroxid vodíka 3 %

- ak ste alergický na peroxid vodíka alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Peroxid vodíka 3 %, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Nepreháľajte tento liek.

Pri opakovanom používaní chráňte tento liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok

Pôsobením tepla, iónov ťažkých kovov a oxidovateľných organických látok sa rozkladá za uvoľnenia kyslíka.

Iné lieky a Peroxid vodíka 3 %

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia v prípadoch uvedených v časti 1.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá pri lokálnom použití (t. j. na kožu alebo na výplach ústnej dutiny – bez prehltnutia) žiadny vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Peroxid vodíka 3 % obsahuje metylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).

3. Ako používať Peroxid vodíka 3 %

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek je vo forme určenej na priame použitie – buď na kožu alebo na výplach ústnej dutiny. Pri použití v ústnej dutine sa môže použité množstvo roztoku zriediť rovnakým objemom vody (1:1).

Ak použijete viac Peroxid vodíka 3 %, ako máte

Pri správnom použití predávkovanie nie je známe.

Pri náhodnom vypití Peroxid vodíka 3 % dochádza k náhlemu uvoľneniu kyslíka v žalúdku, čo spôsobí jeho rozdutie, nevoľnosť, vracanie a podráždenie hornej časti tráviaceho traktu.

Liečba: Napiť sa vody, v ojedinelých prípadoch je potrebné na uvoľnenie tlaku v žalúdku zaviesť nazogastrickú sondu (tenká pružná ohybná hadička, ktorá sa zavádza do žalúdka nosom). Pri prehltnutí malého množstva Peroxid vodíka 3 % liečba nie je potrebná.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Dlhodobejšie opakované používanie roztoku na výplachy ústnej dutiny alebo ako kloktadlo môže vyvolať podráždenie sliznice v oblasti líc alebo neobvyklé zväčšenie filiformných papíl (malých zašpicatených výbežkov na jazyku), tzv. „chlpatý jazyk“. Tieto príznaky vymiznú po ukončení používania lieku.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Peroxid vodíka 3 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na etikete na plastovej fľaši pod označením „Dátum expirácie“.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Peroxid vodíka 3 % obsahuje

- Liečivo je peroxid vodíka. 1 g dermálneho a orálneho roztoku obsahuje 100 mg 30-percentného roztoku peroxidu vodíka.
- Pomocné látky sú čistená voda, metylparahydroxybenzoát (E 218), propylparahydroxybenzoát.

Ako vyzerá Peroxid vodíka 3 % a obsah balenia

- Číra, bezfarebná kvapalina slabého charakteristického zápachu v bielej plastovej (HDPE) fľaši s plastovým (PP/PE) uzáverom, na ktorej je etiketa a písomná informácia pre používateľa vo forme otváraciej etikety. Fľaša nie je zabalená v škatuli.
- Veľkosť balenia: 100 g a klinické balenie 1 000 g.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 32 181 111
e-mail: info@vulm.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2021.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk).