

Písomná informácia pre používateľa

Lisinopril Grindeks 5 mg tablety
Lisinopril Grindeks 10 mg tablety
Lisinopril Grindeks 20 mg tablety

lizinopril

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Lisinopril Grindeks a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lisinopril Grindeks
3. Ako užívať Lisinopril Grindeks
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lisinopril Grindeks
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Lisinopril Grindeks a na čo sa používa

Lisinopril Grindeks obsahuje liečivo nazývané lizinopril. To patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu).

Lisinopril Grindeks možno použiť pri nasledujúcich stavoch:

- na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších;
- na liečbu srdcového zlyhávania u dospelých;
- na liečbu nedávneho srdcového záchvatu (infarktu myokardu) u dospelých;
- na liečbu problémov s obličkami spôsobených diabetom 2. typu u dospelých s vysokým tlakom krvi.

Lisinopril Grindeks spôsobuje rozšírenie vašich krvných ciev. To napomáha zníženiu vášho krvného tlaku. Tiež to vášmu srdcu uľahčuje pumpovanie krvi do všetkých častí vášho tela.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lisinopril Grindeks

Neužívajte Lisinopril Grindeks

- ak ste alergický na lizinopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste mali alergickú reakciu na iný liek obsahujúci ACE inhibítory. Táto alergická reakcia mohla spôsobiť opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, jazyka alebo hrtana. Mohla tiež spôsobiť ťažkosti pri prehltnutí alebo dýchaní (angioedém);
- ak ste užívali alebo teraz užívate sakubitril/valsartan, liek používaný na liečbu určitého typu dlhodobého (chronického) zlyhávania srdca u dospelých, pretože sa u vás zvyšuje riziko angioedému (náhly opuch pod kožou v oblasti, ako je hrdlo);

- ak niektorý člen vašej rodiny mal závažnú alergickú reakciu (angioedém) na nejaký ACE inhibítor alebo ste mali závažné alergické reakcie bez známej príčiny;
- ak ste viac ako 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Lisinoprilu Grindeks v ranom tehotenstve – pozri časť „Tehotenstvo“);
- ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.

Ak si nie ste istí, či sa čokoľvek z tohto týka aj vás, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete Lisinopril Grindeks užívať.

Ak sa u vás po začatí liečby Lisinoprilom Grindeks vyvinie suchý kašeľ, ktorý dlhodobo pretrváva, obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lisinopril Grindeks, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak trpíte zúžením (stenózou) aorty (tepna vo vašom srdci) alebo zúžením srdcových chlopní (zúženie dvojčipej chlopne);
- ak máte zúženie (stenózu) obličkovej tepny;
- ak máte zhrubnutý srdcový sval (známe ako hypertrofická kardiomyopatia);
- ak trpíte ochorením krvných ciev (kolagénová vaskulárna choroba);
- ak máte nízky krvný tlak. Môže sa prejavovať závratom alebo pocitom točenia hlavy, najmä pri rýchlom postavení sa;
- ak máte problémy s obličkami alebo ste dialyzovaný;
- ak máte problémy s pečňou;
- ak máte cukrovku;
- ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, zvyšuje sa riziko angioedému (náhly opuch pod kožou v oblasti, ako je hrdlo):
 - temsirolimus, sirolimus, everolimus a iné lieky zo skupiny mTOR inhibítorov (používané ako prevencia odmietnutia transplantovaného orgánu a na liečbu rakoviny);
 - racekadotril, liek používaný na liečbu hnačky;
 - vildagliptín, liek používaný na liečbu cukrovky;
- ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:
 - blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany – napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou;
 - aliskirén.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Lisinopril Grindeks“:

- ak ste nedávno mali hnačku alebo ste vracali (bolo vám nevoľno);
- ak vám váš lekár povedal, že musíte kontrolovať množstvo soli vo svojej strave;
- ak máte vysoké hladiny cholesterolu a ste liečený tzv. „LDL aferézou“ (liečba na zníženie veľmi vysokej hladiny cholesterolu v krvi);
- musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť). Lisinopril Grindeks sa neodporúča počas skorého tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa v tomto štádiu (pozri časť „Tehotenstvo“);
- ak ste čiernej pleti, pretože Lisinopril Grindeks môže byť menej účinný. Môže sa u vás ľahšie vyskytnúť nežiaduci účinok „angioedém“ (závažná alergická reakcia).

Ak si nie ste istý, či sa čokoľvek z tohto týka aj vás, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Lisinopril Grindeks.

Liečba alergií, ako je poštípanie hmyzom

Ak podstupujete alebo máte podstúpiť liečbu na zoslabenie účinkov alergie, napríklad po uštipnutí hmyzom (desenzitizačnú liečbu), obráťte sa na svojho lekára. Ak užívate Lisinopril Grindeks a pritom podstupujete túto liečbu, môže to spôsobiť závažnú alergickú reakciu.

Operácie

Ak sa chystáte na operáciu (vrátane zubnej operácie), oznámte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Lisinopril Grindeks. Je to preto, že ak užívate Lisinopril Grindeks v kombinácii s určitými lokálnymi alebo celkovými anestetikami, môže sa u vás prejaviť pokles krvného tlaku (hypotenzia).

Deti a dospievajúci

Lisinopril bol študovaný u detí. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na svojho lekára. Lisinopril Grindeks sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov alebo u akýchkoľvek detí so závažnými problémami s obličkami.

Iné lieky a Lisinopril Grindeks

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Lisinopril Grindeks môže ovplyvňovať spôsob, akým iné lieky účinkujú, a niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Lisinoprilu Grindeks. Váš lekár možno bude musieť zmeniť vašu dávku a/alebo urobiť iné opatrenia.

Najmä informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku;
- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Lisinopril Grindeks“ a „Upozornenia a opatrenia“);
- lieky na odvodnenie (diuretiká);
- betablokátory, ako je atenolol a propranolol;
- nitráty (na ochorenia srdca);
- nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) používané na liečbu bolesti a artritídy;
- aspirín (kyselina acetylsalicylová), ak užívate každý deň viac ako 3 gramy;
- lieky na depresiu a duševné problémy, vrátane lítia;
- doplnky draslíka (vrátane náhrad solí), lieky zvyšujúce tvorbu a vylučovanie moču (draslík šetriace diuretiká) a iné lieky, ktoré môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi (napr. trimetoprim a kotrimoxazol, lieky používané na liečbu infekcií spôsobených baktériami, cyklosporín, liek potláčajúci imunitnú odpoveď organizmu používaný na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu, a heparín, liek používaný na riedenie krvi ako prevenciu tvorby krvných zrazenín);
- inzulín alebo lieky na liečbu cukrovky užívané ústami (perorálne);
- lieky na liečbu astmy;
- lieky na liečbu upchatého nosa alebo dutín alebo iné lieky na prechladnutie (vrátane tých, ktoré si môžete kúpiť v lekárni bez lekárskeho predpisu);
- lieky, ktoré potláčajú imunitnú odpoveď organizmu (imunosupresíva);
- alopurinol (na dnu);
- prokaínamid (na problémy s nepravidelným srdcovým rytmom);
- lieky s obsahom zlata, ako je aurotiojablčnan sodný, ktoré sa vám môžu podávať formou injekcie.

Nasledujúce lieky môžu zvýšiť riziko angioedému (znaky angioedému zahŕňajú opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo dýchaní):

- lieky na rozpúšťanie krvných zrazenín (aktívator tkanivového plazminogénu) zvyčajne podávané v nemocnici;
- lieky, ktoré sa používajú najčastejšie ako prevencia odmietnutia transplantovaného orgánu (temsirolimus, sirolimus, everolimus a iné lieky zaradené do triedy mTOR inhibítorov). Pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.
- racekadotril používaný na liečbu hnačky;
- vildagliptín, liek používaný na liečbu cukrovky.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo:

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár vám normálne odporučí, aby ste prestali užívať Lisinopril Grindeks pred otehotnením alebo len čo otehotníte, a odporučí vám namiesto Lisinoprilu Grindeks užívanie iného lieku. Lisinopril

Grindeks sa v ranom tehotenstve neodporúča a nesmie sa užívať, keď tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, nakoľko môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie:

Povedzte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo že chcete začať dojčiť. Lisinopril Grindeks sa neodporúča matkám, ktoré dojčia, a ak chcete dojčiť, váš lekár pre vás vyberie inú liečbu, najmä, ak je vaše dieťa novonarodené alebo predčasne narodené.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

- Niektorí ľudia pociťujú závrat alebo únavu, keď užívajú tento liek. Ak sa to stane aj vám, nevedzte vozidlá alebo nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.
- Musíte počkať, kým uvidíte, ako vás liek ovplyvňuje predtým, ako skúsite vykonávať tieto činnosti.

3. Ako užívať Lisinopril Grindeks

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Keď ste začali užívať Lisinopril Grindeks, lekár vám môže urobiť krvné testy. Lekár potom môže upraviť dávku tak, aby ste užívali správne množstvo lieku.

Užívanie lieku

- Tabletu prehltnite a zapite vodou.
- Pokúste sa tablety užívať každý deň v rovnakom čase. Nezáleží na tom, či užívate Lisinopril Grindeks pred jedlom alebo po jedle.
- Pokračujte v užívaní Lisinoprilu Grindeks tak dlho, ako vám povie váš lekár, je to dlhodobá liečba. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Lisinoprilu Grindeks každý deň.

Užitie prvej dávky

- Buďte zvlášť opatrný pri užití prvej dávky Lisinoprilu Grindeks alebo pri zvýšení dávky. Môže to spôsobiť väčší pokles krvného tlaku ako neskoršie dávky.
- Môžete mať pocit závratu alebo točenia hlavy. Ak sa tak stane, pomôže, ak si ľahnete. Ak máte obavy, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.

Dospelí

Vaša dávka závisí od vášho klinického stavu a či užívate aj nejaké iné lieky. váš lekár vám povie, koľko tabliet máte užiť každý deň. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pri vysokom krvnom tlaku

- Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne.
- Zvyčajná dlhodobá užívaná dávka je 20 mg jedenkrát denne.

Pri srdcovom zlyhávaní

- Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.
- Dlhodobá užívaná dávka je 5 až 35 mg jedenkrát denne.

Po srdcovom záchvate

- Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg v priebehu 24 hodín po záchvate a 5 mg nasledujúci deň.
- Zvyčajná dlhodobá užívaná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Pri obličkových problémoch spôsobených cukrovkou

- Odporúčaná dávka je alebo 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne.

Ak ste starší, máte problémy s obličkami alebo užívate diuretiká, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku, ako je zvyčajná dávka.

Použitie u detí a dospievajúcich (6 až 16 rokov) s vysokým krvným tlakom

- Lisinopril Grindeks sa neodporúča u detí do 6 rokov, ani u žiadnych detí so závažným ochorením obličiek.
- Lekár vášmu dieťaťu stanoví správnu dávku. Dávka závisí od telesnej hmotnosti dieťaťa.
- Pre deti, ktoré vážia od 20 do 50 kg, je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg jedenkrát denne.
- Pre deti, ktoré vážia viac ako 50 kg, je odporúčaná počiatočná dávka 5 mg jedenkrát denne.

Ak užijete viac Lisinoprilu Grindeks, ako máte

Ak užijete viac Lisinoprilu Grindeks, ako vám predpísal lekár, obráťte sa na lekára alebo choďte ihneď do nemocnice. Najpravdepodobnejšie sa prejavia nasledujúce účinky: závrat, palpitácie (zmeny srdcového rytmu).

Ak zabudnete užiť Lisinopril Grindeks

- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, len čo si spomeniete. Avšak ak je už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, vynechajte zabudnutú dávku.
- Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.

Ak prestanete užívať Lisinopril Grindeks

Neprestávajte užívať tablety, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akákoľvek z nasledujúcich reakcií, **prestaňte užívať Lisinopril Grindeks a ihneď navštívte svojho lekára:**

- závažné alergické reakcie (zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov). Príznaky môžu zahŕňať rýchly nástup:
 - opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním;
 - ťažkého alebo náhleho opuchu rúk, nôh alebo členkov;
 - sťaženého dýchania;
 - silného svrbenia kože (s tvorbou hrčiek).
- závažné kožné poruchy, ako náhly, neočakávaný výsev vyrážky alebo pálenie, červená alebo olupujúca sa koža (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov);
- infekcia s príznakmi, ako je horúčka a vážne zhoršenie vášho celkového stavu, alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako zapálené hrdlo/hrtan/ústa alebo problémy s močením (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov)

- bolesť hlavy;
- závrat alebo pocit točenia hlavy, najmä pri rýchlom postavení sa;
- hnačka;
- suchý kašeľ, ktorý neprestáva;
- nevoľnosť (vracanie);
- problémy s obličkami (prejaví sa v krvných testoch).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov)

- zmeny nálady;

- zmena farby prstov na vašich rukách alebo nohách (bledomodrá, po ktorej nasleduje začervenanie) alebo znížená citlivosť alebo pálenie v prstoch na vašich rukách alebo nohách;
- zmena vnímania chuti;
- pocit ospalosti;
- pocit točenia (vertigo);
- problémy so spánkom;
- cievna mozgová príhoda;
- rýchly srdcový tep;
- nádcha;
- pocit na vracanie (nauzea);
- bolesť žalúdka a poruchy trávenia;
- kožná vyrážka alebo svrbenie;
- neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia);
- pocit únavy alebo pocit slabosti (strata sily);
- veľmi veľký pokles krvného tlaku môže nastať u ľudí s nasledovnými stavmi: ochorenie koronárnych ciev; zúženie aorty (srdcová tepna), obličkovej tepny alebo srdcových chlopní; zhrubnutie srdcového svalu. Ak sa vám toto príhodi, môžete pociťovať závrat alebo pocit točenia hlavy, najmä pri rýchlom postavení sa;
- zmeny krvných testov, ktoré ukazujú, ako dobre funguje vaša pečeň a obličky;
- srdcový záchvat;
- zrakové a/alebo sluchové halucinácie.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov)

- pocit zmätenosti;
- kožná vyrážka (žihľavka);
- sucho v ústach;
- vypadávanie vlasov;
- psoriáza (kožné ochorenie);
- zmeny vo vnímaní vône;
- zväčšenie prsníkov u mužov;
- zmeny v niektorých krvných bunkách alebo iných častiach krvi. Váš lekár vám môže z času na čas odobrať vzorku krvi, aby sledoval účinky Lisinoprilu Grindeks na vašu krv. Tieto prejavy môžu zahŕňať únavu, bledú kožu, zapálené hrdlo, vysokú teplotu (horúčku), bolesti kĺbov a svalov, opuch kĺbov alebo uzlín, alebo citlivosť na slnečné svetlo;
- nízke hladiny sodíka v krvi (príznaky môžu byť únava, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie);
- náhle zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov)

- zápal prínosových dutín (pocity bolesti a plnosti za lícami a očami);
- sipot;
- nízke hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Prejavy môžu zahŕňať pocit hladu alebo slabosť, potenie a rýchle búšenie srdca;
- zápal pľúc. Prejavy zahŕňajú kašeľ, pocit dýchavičnosti a vysokú teplotu (horúčku);
- zožltnutie kože alebo bielka očí (žltacka);
- zápal pečene. Tento môže spôsobiť stratu chuti do jedla, zožltnutie kože a očí a tmavo sfarbený moč;
- zápal podžalúdkovej žľazy. Spôsobí stredne silné až silné bolesti v žalúdku;
- závažné kožné ochorenia. Príznaky zahŕňajú začervenanie kože, tvorbu pľuzgierov a olupovanie kože;
- potenie;
- vylučovanie menšieho množstva vody (moču) ako zvyčajne alebo žiadne močenie;
- zlyhanie pečene;
- kožné hrčky;
- zápal čreva.

Neznáme (z dostupných údajov)

- príznaky depresie;

- mdloba.

Vedľajšie účinky u detí sa zdajú byť porovnateľné s tými, ktoré sa zaznamenali u dospelých.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Lisinopril Grindeks

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lisinopril Grindeks 5 mg tablety:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Lisinopril Grindeks 10 mg a Lisinopril Grindeks 20 mg tablety:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lisinopril Grindeks obsahuje

- Liečivo je lizinopril (ako dihydrát). Každá tableta obsahuje 5 mg, 10 mg alebo 20 mg lizinoprilu (ako dihydrát).
- Ďalšie zložky sú hydrogenfosforečnan vápenatý (E341); kukuričný škrob; manitol (E421); krospovidón (E1202); oxid kremičitý, koloidný, bezvodý (E551); stearát horečnatý (E572).

Ako vyzerá Lisinopril Grindeks a obsah balenia

Lisinopril Grindeks 5 mg tablety: biele, okrúhle hladké neobalené tablety so skosenými hranami.

Rozmery tablety: priemer 6 mm.

Lisinopril Grindeks 10 mg tablety: biele, okrúhle hladké neobalené tablety so skosenými hranami a dvojitou deliacou ryhou na jednej strane. Rozmery tablety: priemer 8 mm. Deliaci ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Lisinopril Grindeks 20 mg tablety: biele, okrúhle hladké neobalené tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Rozmery tablety: priemer 10 mm. Deliaci ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Tablety Lisinoprilu Grindeks sú dostupné v škatuľkách obsahujúcich hliník/PVC/PVDC blistre so 14, 28, 30, 56, 60, 84 alebo 98 tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

Tel: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Estónsko	Lisinopril Grindeks
Belgicko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimés pelliculés
Bulharsko	Лизиноприл Гриндекс 5 mg, 10 mg, 20 mg таблетки Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablets
Fínsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit
Francúzsko	Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé
Grécko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg δισκία
Írsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablets
Maďarsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tableta
Poľsko	Lisinopril Grindeks
Portugalsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos
Rakúsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten
Rumunsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimate
Slovensko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablety
Španielsko	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos
Taliansko	Lisinopril Grindeks

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2023.