

Čo mám vedieť o Xarelto?

- ◆ Xarelto zrieduje krv, čím u Vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.
- ◆ Xarelto sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**
- ◆ Xarelto nesmiete prestať užívať bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali s vaším lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.

- ◆ Predtým ako začnete užívať Xarelto, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- ◆ Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom, pri ktorom dochádza k narušeniu celistvosti kože alebo slizníc, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Xarelto.

Kedy mám vyhľadať pomoc môjho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Xarelto, je dôležité, aby ste si boli vedomý

možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Xarelto nezačnite užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojim lekárom. Okamžite informujte zdravotníckeho pracovníka, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- ◆ bolesť,
- ◆ opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- ◆ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- ◆ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- ◆ menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne,

- ◆ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- ◆ vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

Ako mám Xarelto užívať?

- ◆ Na zabezpečenie optimálnej ochrany sa musí Xarelto:
 - 2,5 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 10 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 15 mg sa musí užívať s jedlom
 - 20 mg sa musí užívať s jedlom

90368359

SK

Pohotovostná karta pacienta



Xarelto[®] 2,5 mg
Xarelto[®] 10 mg
Xarelto[®] 15 mg
Xarelto[®] 20 mg

- ◆ Túto kartu nosťte vždy so sebou
- ◆ Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubnému lekárovi

**Užívam antikoagulačnú liečbu
Xareltom (rivaroxaban)**

_____	_____
Meno:	Iné lieky / ochorenia
_____	_____
Adresa:	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Dátum narodenia:	Hmotnosť:
_____	_____
_____	_____

**V naliehavom prípade,
prosím, kontaktujte:**

Meno lekára:

Telefón lekára:

Pečiatka lekára:

Informujte, prosím, aj:

Meno:

Telefón:

Vzťah k pacientovi:

**Informácia pre
zdravotníckych
pracovníkov:**

- ◆ Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Xarelta.

