

Písomná informácia pre používateľa

Espumisan L
40 mg/ml, perorálne emulzné kvapky

simetikón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkolvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa nebudeste cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Espumisan L a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Espumisan L
3. Ako užívať Espumisan L
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Espumisan L
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Espumisan L a na čo sa používa

Espumisan L obsahuje liečivo simetikón, ktorý pôsobí v žalúdkovo-črevnom trakte ako odpeňovacia látka a používa sa ako diagnostická pomôcka. Môže sa používať pre všetky vekové skupiny.

Liečivo simetikón rozkladá plynové bubliny nachádzajúce sa v priatej potrave a v sliznici žalúdkovo-črevného traktu. Plyny uvoľnené týmto procesom sa následne môžu cez črevnú stenu vstrebať a vylúčiť prostredníctvom pohybu čriev.

Použitie

- Na liečbu príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynnimi, napr. hromadenie plynov v črevách (flatulencia, meteorizmus), pocit plnosti a detská kolika
- Na prípravu pred diagnostickým vyšetrením v oblasti brucha, napr. röntgenové vyšetrenie, sonografia (ultrazvukové vyšetrenie) a gastroskopia
- Ako odpeňovací prostriedok pri otrave detergentami (tenzidmi)

Ak sa nebudeste cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Espumisan L

Neužívajte Espumisan L

- ak ste alergický na simetikón alebo na ktorúkolvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Espumisan L, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade novoobjavených a/alebo pretrvávajúcich ťažkostí v brušnej dutine treba navštíviť lekára, aby sa mohla identifikovať príčina ťažkostí a možné základné ochorenie, ktoré vyžaduje liečbu.

Iné lieky a Espumisan L

Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neexistujú žiadne obmedzenia užívania Espumisanu L počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Espumisanu L obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednom mililitri, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Espumisan L

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Odporučaná dávka je:

Liečba príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynnimi

- napr. flatulencia (meteorizmus), pocit plnosti, detská kolika:

Veková skupina	Dávkovanie v kvapkách (ml)	Častosť podania
Dojčatá	25 kvapiek (zodpovedá 1 ml) do každej fl'ašky s mliekom alebo pred alebo po každom dojčení	
Deti vo veku 1 – 6 rokov	25 kvapiek (zodpovedá 1 ml)	3 až 5 krát denne
Deti vo veku 6 – 14 rokov	25 - 50 kvapiek (zodpovedá 1 - 2 ml)	3 až 5 krát denne
Dospievajúci nad 14 rokov a dospelí	50 kvapiek (zodpovedá 2 ml)	3 až 5 krát denne

Poznámka: Espumisan L sa môže užívať aj po operáciach.

Espumisan L sa užíva s jedlom alebo po jedle, ak je to potrebné, aj pred spaním.

Dĺžka užívania Espumisanu L závisí od pretrvávajúcich ťažkostí.

Ak je to potrebné, Espumisan L sa môže užívať aj dlhodobo.

Príprava na diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha

- **röntgenové vyšetrenie, ultrazvuk:**

Deň pred vyšetrením	Ráno v deň vyšetrenia
3-krát 2 ml (zodpovedá 3-krát 50 kvapiek)	2 ml (zodpovedá 50 kvapiek)

- **Ako prídavok k suspenziám kontrastných látok:**

4 – 8 ml (zodpovedá 100 - 200 kvapiek) na 1 liter kontrastnej látky pre dvojité kontrastné zobrazenie

- **Príprava na endoskopické vyšetrenie hornej časti žalúdkovo-črevného traktu (gastroskopia):**

Pred endoskopiou 4 - 8 ml (zodpovedá 100 - 200 kvapiek).
Ak je to potrebné, niekoľko ml emulzie sa môže podať cez endoskopickú trubicu počas vyšetrenia na odstránenie penových bublín, ktoré prekážajú pri vyšetrení.

Ako odpeňovací prostriedok pri otrave detergentami (tenzidmi):

Závisí od závažnosti otravy:

Vek	Dávka
Deti	2,5 – 10 ml (zodpovedá 65 kvapiek až 1/3 obsahu fl'aštičky)
Dospelí	10 – 20 ml (zodpovedá 1/3 až 2/3 obsahu fl'aštičky)

Poznámka: Ak užijete Espumisan L ako prvú pomoc po prehltnutí detergentu, musíte **ihned** navštíviť lekára!

Spôsob užívania

Pred použitím fl'aštičku dobre potraste.

Pri kvapkaní držte fl'aštičku obrátenú nadol.

25 kvapiek (1 ml perorálnych emulzných kvapiek) obsahuje 40 mg simetikónu.

Ak užijete viac Espumisanu L, ako máte

Otrava po užíti Espumisanu L nie je známa.

Liečivo Espumisanu L, simetikón, rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne fyzikálnym spôsobom a je biologicky a chemicky úplne neaktívny. Otrava je preto prakticky vylúčená. Aj veľké množstvá Espumisanu L boli znášané bez problémov.

Ak zabudnete užiť Espumisan L

Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradíť.

Ak prestanete užívať Espumisan L

Môže dôjsť k návratu ťažkostí.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie vrátane žihľavky, vyrážky, sčervenania kože, svrbenia, alergickej dermatitídy a iných kožných reakcií boli hlásené pre lieky obsahujúce simetikón. Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov (frekvencia neznáma).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národnécentrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Espumisan L

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku na flaštičke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Upozornenie o dobe použitia po prvom otvorení: Espumisan L sa môže používať 6 mesiacov po prvom otvorení.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Espumisan L obsahuje

- Liečivo je simetikón.
25 kvapiek (1 ml perorálnych emulzných kvapiek) obsahuje 40 mg simetikónu.
- Ďalšie zložky sú makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40 - 55, kyselina sorbová, hydroxid sodný, chlorid sodný, karboméry, citrónan sodný, sukralóza, čistená voda.

Ako vyzerá Espumisan L a obsah balenia

Espumisan L je mliečno-biela až žltkastá, nízko-viskózna emulzia.

Espumisan L je dostupný v baleniach:

30 ml perorálnych emulzných kvapiek (v sklenenej flaštičke jantárovej farby so skrutkovacím polypropylénovým uzáverom a s polyetylénovým kvapkadlom).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2024.