

Písomná informácia pre používateľa

**Treprostинil Reddy 1 mg/ml infúzny roztok
Treprostинil Reddy 2,5 mg/ml infúzny roztok
Treprostинil Reddy 5 mg/ml infúzny roztok
Treprostинil Reddy 10 mg/ml infúzny roztok**

treprostинil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Treprostинil Reddy a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Treprostинil Reddy
3. Ako používať Treprostинil Reddy
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Treprostинil Reddy
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Treprostинil Reddy a na čo sa používa

Čo je Treprostинil Reddy

Liečivo lieku Treprostинil Reddy je treprostинil.

Treprostинil patrí do skupiny liekov, ktoré účinkujú podobným spôsobom ako prirodzené sa vyskytujúce prostacyklíny. Prostacyklíny sú látky podobné hormónom, ktoré znižujú krvný tlak tak, že uvoľňujú krvné cievy, čo spôsobuje, že sa rozšíria, a tým umožňia ľahší prietok krvi. Prostacyklíny môžu tiež ovplyvňovať prevenciu tvorby krvných zrazenín.

Na čo sa Treprostинil Reddy používa

Treprostинil Reddy sa používa na liečbu idiopatickej alebo dedičnej plúcnej artériovej hypertenzie (pulmonary arterial hypertension, PAH) u pacientov s príznakmi strednej závažnosti. Plúcna artériová hypertenzia je stav, keď je váš krvný tlak v krvných cievach medzi srdcom a plúcami príliš vysoký, čo spôsobuje ťažkosti pri dýchaní, závraty, únavu, mdloby, búšenie srdca alebo neobvyklý srdcový tep, suchý kašeľ, bolesť na hrudi a opuchy členkov alebo nôh.

Treprostинil Reddy sa najprv podáva ako plynulá subkutánna (pod kožu) infúzia. Je možné, že niektorí pacienti ju nebudú schopní tolerovať kvôli bolesti a opuchu v mieste podávania. Váš lekár rozhodne, či sa namiesto toho Treprostинil Reddy môže podávať plynulou intravenóznou (priamo do žily) infúziou. Toto si bude vyžadovať zavedenie centrálnej venóznej hadičky (katéter), ktorá sa zvyčajne nachádza na krku, hrudníku alebo slabinách.

Ako Treprostинil Reddy účinkuje

Treprostинil Reddy znižuje krvný tlak v plúcnej tepne tak, že zlepšuje prietok krvi a znižuje objem práce, ktorú musí srdce vykonať. Zlepšený prietok krvi viedie k zlepšenému prívodu kyslíka do tela a k zniženej zátŕaži srdca, čo spôsobuje, že funguje efektívnejšie. Treprostинil Reddy zlepšuje príznaky súvisiace s PAH a schopnosť cvičiť u pacientov, ktorí sú z hľadiska aktivity obmedzení.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Treprostinil Reddy

Nepoužívajte Treprostinil Reddy

- ak ste alergický (precitlivený) na treprostinil, metakrezol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
- ak vám bolo diagnostikované ochorenie s názvom „pulmonárna (plúcna) venookluzívna choroba“. To je ochorenie, pri ktorom krvné cievy vedúce krv cez vaše plúca opuchnú a upchajú sa, čo vedie k vyššiemu tlaku v krvných cievach medzi srdcom a plúcami.
- ak máte závažné ochorenie pečene
- ak máte problém so srdcom, napríklad:
 - srdcový infarkt (infarkt myokardu) počas posledných šiestich mesiacov
 - závažné zmeny srdcového tepu
 - závažné koronárne ochorenie srdca alebo nestabilnú angínu
 - bola vám diagnostikovaná porucha srdca, ako napríklad porucha srdcovej chlopne, ktorá spôsobuje, že srdce pracuje slabo
 - akékoľvek ochorenie srdca, ktoré sa nelieči alebo nie je pod starostlivým lekárskym pozorovaním
- ak máte špecifické vysoké riziko krvácania – napríklad aktívne žalúdočné vredy, úrazy alebo iné stavky krvácania
- ak ste počas posledných 3 mesiacov mali cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu) alebo akékoľvek iné prerušenie zásobovania mozgu krvou.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Treprostinil Reddy, obráťte sa na svojho lekára:

- ak máte akékoľvek ochorenie pečene
- ak ste boli upozorený, že ste z lekárskeho hľadiska obézni (BMI vyšší ako 30 kg/m²)
- ak máte infekciu spôsobenú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human Immunodeficiency Virus, HIV)
- ak máte vysoký krvný tlak v žilách vašej pečene (portálna hypertenzia)
- ak máte vrodenú poruchu srdca, ktorá ovplyvňuje to, ako vaša krv cezeň prúdi.

Počas vašej liečby Treprostiniom Reddy povedzte svojmu lekárovi:

- ak vám poklesne krvný tlak (hypotenzia)
- ak sa u vás objaví rýchly nárast tăžkostí s dýchaním alebo pretrvávajúci kašeľ (toto môže súvisieť s upchatím v plúcach alebo s astmou alebo s iným stavom), **okamžite sa porad'te so svojím lekárom**.
- ak máte nadmerné krvácanie, keďže treprostinil môže zvyšovať toto riziko zabránením zrážania krvi
- ak sa u vás počas intravenózneho podávania treprostiniu objaví horúčka alebo miesto podávania intravenóznej infúzie sčervenie, opuchne a/alebo je na dotyk bolestivé, keďže to môže byť prejavom infekcie.

Iné lieky a Treprostinil Reddy

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

- lieky používané na liečbu **vysokého krvného tlaku** (antihypertenzíva alebo iné vazodilatanciá)
- lieky používané na zvýšenie rýchlosťi **močenia** (diuretiká) vrátane furosemidu
- lieky, ktoré zastavujú **zrážanie krvi** (antikoagulanciá), ako sú lieky na báze warfarínu, heparínu alebo oxidu dusnatého
- akékoľvek nesteroidové protizápalové lieky (non steroidal anti-inflammatory drugs, **NSAID**), (napr. kyselina acetyl salicylová, ibuprofén)
- lieky, ktoré môžu zosilniť alebo zoslabiť účinok Treprostiniu Reddy (napr. gemfibrozil, rifampicín, trimetoprim, deferasirox, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovany), pretože vám lekár možno bude musieť upraviť dávku lieku Treprostinil Reddy.

Tehotensstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotniť, poradťte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ak ste tehotná, plánujete otehotniť alebo si myslíte, že ste tehotná, Treprostinil Reddy sa neodporúča, pokial' to lekár nepovažuje za nevyhnutné. Bezpečnosť tohto lieku na použitie počas tehotenstva nie je stanovená.

Treprostinil Reddy sa neodporúča používať počas dojčenia, pokial' to lekár nepovažuje za nevyhnutné. Ak vám predpísali Treprostinil Reddy, odporúča sa prestat' dojčiť, pretože nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka.

Ženy v plodnom veku

Počas liečby Treprostinilom Reddy sa dôrazne odporúča antikoncepcia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Treprostinil Reddy môže vyvolať nízky krvný tlak so závratmi alebo mdlobami. V takomto prípade nevedťte vozidlá ani neobsluhujte stroje a požiadajte svojho lekára o radu.

Treprostinil Reddy obsahuje sodík a metakrezol

Tento liek obsahuje 74,0 mg (1 mg/ml), 74,9 mg (2,5 mg/ml), 78,4 mg (5 mg/ml) a 74,8 mg (10 mg/ml) sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v každej injekčnej liekovke. To sa rovná 3,7 % (1 mg/ml a 2,5 mg/ml a 10 mg/ml) and 3,9 % (5 mg/ml) odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

Metakrezol môže spôsobiť alergické reakcie.

3. Ako používať Treprostinil Reddy

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Treprostinil Reddy sa podáva vo forme plynulej infúzie bud':

- subkutánne (pod kožu) cez malú hadičku (kanyla), ktorá je umiestnená na bruchu alebo stehne; alebo
- intravenózne (do žily) cez hadičku (katéter), ktorá sa zvyčajne umiestňuje do krku, hrude alebo slabín.

Na subkutánnu infúziu sa má liek podávať nezriedený.

Na intravenóznu infúziu sa má liek zriediť v súlade s pokynmi predpisujúceho lekára a môže sa zriediť iba sterilnou vodou na injekciu alebo 0,9 % (w/v) injekčným roztokom chloridu sodného.

V oboch prípadoch sa Treprostinil Reddy cez hadičku posúva pomocou prenosnej pumpy.

Predtým, ako opustíte nemocnicu alebo kliniku, lekár vám vysvetlí, ako sa Treprostinil Reddy pripraví a akou rýchlosťou má pumpa dodávať Treprostinil Reddy.

Musíte tiež dostať informácie o tom, ako sa pumpa správne používa a čo máte urobiť, ak prestane fungovať. Tieto informácie vám tiež poskytnú údaje o tom, koho máte v prípade neočakávanej udalosti kontaktovať.

Premývanie infúzneho prívodu počas pripojenia môže spôsobiť náhodné predávkovanie.

Treprostinil Reddy sa riedi iba v prípade plynulého intravenózneho podávania infúzie:

Na intravenóznu infúziu: Roztok Treprostinilu Reddy sa musí zriediť len sterilou vodou na injekcie alebo 0,9 % sterilným injekčným roztokom chloridu sodného (ktorý poskytne váš lekár), len ak sa podáva ako kontinuálna intravenózna infúzia.

Dospelí pacienti

Treprostinil Reddy je dostupný ako 1 mg/ml; 2,5 mg/ml; 5 mg/ml alebo 10 mg/ml infúzny roztok. Váš lekár určí vhodnú rýchlosť a dávku infúzie podľa vášho stavu.

Pacienti s nadváhou

Ak máte nadváhu (hmotnosť o 30 % alebo viac ako vaša ideálna telesná hmotnosť), váš lekár určí začiatočnú dávku a ďalšie dávky na základe vašej ideálnej telesnej hmotnosti. Prečítajte si tiež časť 2 „Upozornenia a opatrenia“.

Starší pacienti

Váš lekár určí vhodnú rýchlosť a dávku infúzie podľa vášho stavu.

Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich sú k dispozícii obmedzené údaje.

Úprava dávkovania

Rýchlosť infúzie sa môže znížiť alebo zvýšiť v jednotlivých prípadoch, a to **len pod lekárskym dohľadom**.

Cieľom úpravy rýchlosťi infúzie je stanoviť účinnú udržateľnú rýchlosť, ktorá zlepšuje príznaky PAH a minimalizuje akékoľvek vedľajšie účinky.

Ak príznaky pribudnú alebo ak potrebujete úplný oddych, alebo ak ste pripútaný na lôžko alebo kreslo, alebo ak vám akékoľvek fyzická aktivita spôsobuje nepríjemný pocit a vaše príznaky sa objavujú v stave pokoja, nezvyšujte vašu dávku bez odporúčania lekára. Je možné, že tento liek nebude už stačiť na liečbu vášho ochorenia a bude potrebná iná liečba.

Ako možno predísť infekciám krvného obehu počas intravenóznej liečby Treprostinilom Reddy?

Ako pri akejkoľvek dlhodobej intravenóznej liečbe, aj tu existuje riziko výskytu infekcií krvného obehu. Váš lekár vás poučí, ako im predísť.

Ak použijete viac Treprostinilu Reddy, ako máte

Ak sa náhodne predávkujete týmto liekom, môže sa u vás objaviť nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, nízky krvný tlak (závrat, točenie hlavy alebo mdloby), sčervenenie kože a/alebo bolest' hlavy.

Ak sa niektoré z týchto vedľajších účinkov stanú závažnými, musíte okamžite kontaktovať svojho lekára alebo nemocnicu. Váš lekár môže znížiť alebo prerušiť infúziu, pokiaľ vaše príznaky nevymiznú. Infúzny roztok Treprostinil Reddy sa opakovane začne podávať neskôr v dávkach odporúčaných vaším lekárom.

Ak prestanete používať Treprostinil Reddy

Vždy používajte Treprostinil Reddy podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotníckeho špecialistu. Neprestaňte používať Treprostinil Reddy, pokiaľ vám to neodporúčí váš lekár.

Náhle ukončenie alebo náhle zníženie rýchlosťi dávkovania treprostinilu môže spôsobiť návrat pľúcnej artériovej hypertenzie s možnosťou rýchleho a závažného zhoršenia vášho stavu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- rozšírenie krvných ciev so sčervením kože
- bolest' alebo citlivosť v okolí miesta infúzie
- zmena farby kože alebo tvorba modrín v okolí miesta infúzie
- bolest' hlavy
- kožné vyrážky
- nutkanie na vracanie
- hnačka
- bolest' sánky

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- závrat
- vracanie
- točenie hlavy alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom
- svrbenie alebo sčervenie kože
- opuch chodidiel, členkov, nôh alebo zadržiavanie tekutín
- príhody krvácania, ako je krvácanie z nosa, vykašliavanie krvi, krv v moči, krvácanie z d'asien, krv v stolici
- bolest' kĺbov, bolest' svalov, bolest' nôh a/alebo rúk

Iné možné vedľajšie účinky (častosť neznáma (nemožno odhadnúť z dostupných údajov))

- infekcia v mieste infúzie
- absces (ložisko hnisu) v mieste infúzie
- zníženie počtu krvných doštíčiek (trombocytov) v krvi (trombocytopénia)
- krvácanie v mieste podania infúzie
- bolest' kostí
- kožné vyrážky so zmenou farby kože alebo vystúpenými hrčami
- infekcia tkaniva pod kožou (celulitída)
- prílišné čerpanie krvi zo srdca, čo vedie k ťažkostiam pri dýchaní, únavе, opuchu nôh a nadúvaniu z dôvodu nahromadenia tekutiny, pretrvávajúci kašeľ

Ďalšie vedľajšie účinky spojené s intravenóznou cestou podávania

- zápal žily (tromboflebitída)
- bakteriálna infekcia krvného obehu (bakterémia)* (pozri časť 3)
- septikémia (závažná bakteriálna infekcia krvi)

*Hlásili sa život ohrozujúce alebo smrteľné prípady bakteriálnej infekcie krvného obehu.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Treprostinil Reddy

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Počas plynulej subkutanej infúzie je potrebné použiť jeden zásobník (injekčná striekačka) neriedeného Treprostiniu Reddy do 72 hodín.

Počas plynulej intravenóznej infúzie je potrebné použiť jeden zásobník (injekčná striekačka) zriadeného Treprostinilu Reddy do 24 hodín.

Injekčná liekovka Treprostinilu Reddy sa musí použiť alebo zlikvidovať do 30 dní po prvom otvorení. Akýkoľvek zvyšný zriadený roztok sa má zlikvidovať.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akékoľvek poškodenie injekčnej liekovky, zmenu farby alebo iné prejavy zhoršenia kvality (napr. prítomnosť častíc).

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Treprostinil Reddy obsahuje

Liečivo je treprostinil. Každý ml obsahuje 1 mg, 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg treprostinilu (ako treprostinil sodný). Každá injekčná liekovka obsahuje 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg treprostinilu (ako treprostinil sodný).

Ďalšie zložky sú:

citrónan sodný (E331), chlorid sodný, metakrezol, voda na injekcie a na úpravu pH hydroxid sodný (E524) a kyselinu chlorovodíkovú (E507).

Ako vyzerá Treprostinil Reddy a obsah balenia

Treprostinil Reddy je číry bezfarebný až svetložltý roztok, ktorý je dostupný v sklenenej injekčnej liekovke s chlórbutylovou zátkou uzavretej (špecifickým farebným) vyklápacím plastovým viečkom s hliníkovým uzáverom:

- Treprostinil Reddy 1 mg/ml infúzny roztok má **žlté** viečko.
- Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml infúzny roztok má **modré** viečko.
- Treprostinil Reddy 5 mg/ml infúzny roztok má **zelené** viečko.
- Treprostinil Reddy 10 mg/ml infúzny roztok má **červené** viečko.

Každá škatuľka obsahuje jednu injekčnú liekovku s 20 ml infúzneho roztoku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reddy Holding GmbH
Kobelweg 95
86156 Augsburg
Nemecko

Výrobca

betapharm Arzneimittel GmbH
Kobelweg 95
86156 Augsburg
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

	Treprostinil Reddy 1 mg/ml oplossing voor infusie
Belgicko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml infuzní roztok
Česká republika:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml infuzní roztok
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml infuzní roztok
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml infuzní roztok
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml infusionvæske, opløsning
Dánsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml infusionvæske, opløsning
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml infusionvæske, opløsning
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml infusionvæske, opløsning
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml Infusionslösung
Nemecko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml Infusionslösung
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml Infusionslösung
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml Infusionslösung
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml infuusioneste, liuos
Fínsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml infuusioneste, liuos
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml infuusioneste, liuos
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml oldatos infúzió
Maďarsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml oldatos infúzió
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml oldatos infúzió
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml oldatos infúzió
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml solution for infusion
Írsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml solution for infusion
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml solution for infusion
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml solution for infusion
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml oplossing voor infusie
Holandsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 5 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 10 mg/ml oplossing voor infusie
	Treprostinil Reddy 1 mg/ml infusjonsvæske, opplösning
Nórsko:	Treprostinil Reddy 2,5 mg/ml infusjonsvæske, opplösning

	Treprostинil Reddy 5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
	Treprostинil Reddy 10 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
	Treprostинil Reddy 1 mg/ml roztwór do infuzji
	Treprostинil Reddy 2,5 mg/ml roztwór do infuzji
Pol'sko:	Treprostинil Reddy 5 mg/ml roztwór do infuzji
	Treprostинil Reddy 10 mg/ml roztwór do infuzji
	Treprostинil Reddy 1 mg/ml solução para perfusão
	Treprostинil Reddy 2,5 mg/ml solução para perfusão
Portugalsko:	Treprostинil Reddy 5 mg/ml solução para perfusão
	Treprostинil Reddy 10 mg/ml solução para perfusão
	Treprostинil Reddy 1 mg/ml infúzny roztok
	Treprostинil Reddy 2,5 mg/ml infúzny roztok
Slovenská republika:	Treprostинil Reddy 5 mg/ml infúzny roztok
	Treprostинil Reddy 10 mg/ml infúzny roztok
	Treprostинil Reddy 1 mg/ml infusionsvätska, lösning
	Treprostинil Reddy 2,5 mg/ml infusionsvätska, lösning
Švédsko:	Treprostинil Reddy 5 mg/ml infusionsvätska, lösning
	Treprostинil Reddy 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2024.