

Písomná informácia pre používateľa

Glucose Fresenius Kabi 5 % infúzny roztok

glukóza

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Glucose Fresenius Kabi 5 % a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Glucose Fresenius Kabi 5 %
3. Ako sa Glucose Fresenius Kabi 5 % podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Glucose Fresenius Kabi 5 %
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Glucose Fresenius Kabi 5 % a na čo sa používa

Glucose Fresenius Kabi 5 % je infúzny roztok s obsahom glukózy, určený na intravenózne (vnútrozilové) podanie. Je zbavený choroboplodných zárodkov, nevyvoláva horúčku a neobsahuje žiadne látky pôsobiace proti mikroorganizmom, látky brániace rastu mikróbov ani stabilizujúce prísady.

Je určený na:

- zabránenie nadmernej strate tekutín, nadmerného rozkladu bielkovín, vyčerpania látky nazývanej glykogén v pečeni, napríklad pri obmedzenom prívode tekutín a potravy pred a po chirurgických operáciach, pri pokročilej pečeňovej a obličkovej nedostatočnosti, pri ochoreniach tráviaceho traktu;
- úpravu nadmernej straty tekutín, tak celkovej ako aj pri výskytu nadbytku soli, ktorý vznikol ako dôsledok nerovnomerného dopĺňania vody alebo pri nadmernej strate vody močom alebo potením (vnútrobunková dehydratácia);
- prevenciu a liečbu stavu nazývaného ketóza, zapríčineného podvýživou, hnačkou, vracaním, horúčkou;
- stimuláciu vylučovania sodíka močom v prípade nadmerného používania roztokov elektrolytov, ktoré obsahujú tento prvak;
- používa sa tiež ako nosný alebo zriedovací roztok pre podávanie iných liečiv do žily.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Glucose Fresenius Kabi 5 %

Glucose Fresenius Kabi 5 % vám nesmú podať

- ak ste alergický na monohydrtát glukózy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak máte nadbytok vody v organizme (hyperhydratácia);
- ak ste podstúpili neurochirurgickú operáciu;
- ak máte vnútrolebečné (endokraniálne) krvácanie alebo krvácanie v chrbtici (endospinálne);

- ak máte nadbytok kyslých látok v krvi (acidóza);
- ak máte cukrovku, ktorá nie je kontrolovaná;
- ak máte zvýšenú hladinu cukru v krvi (hyperglykémia);
- ak máte nedostatok vody v organizme, spojený so zvýšenou stratou sodíka (hypotonická dehydratácia);
- ak máte zníženú hladinu draslíka v krvi, bez súčasného doplnenia draslíka;
- ak máte hyperosmolaritu;
- ak dostávate transfúziu, roztoky glukózy sa nesmú podávať súčasne s krvnými preparátmami tou istou infúznou súpravou.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Glucose Fresenius Kabi 5 %, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnícu.

Osobitná starostlivosť bude venovaná, ak:

- máte akútne ochorenie, bolest', pooperačný stres, infekcie, popáleniny, ochorenia centrálneho nervového systému,
- máte ochorenie srdca, pečene alebo obličiek,
- sa liečite liekom zvyšujúcim účinok vazopresínu (hormónu, ktorý reguluje zadržiavanie vody v tele), pretože to môže zvýšiť riziko nízkych hladín sodíka v krvi (hyponatriémia). (Pozri tiež časť nižšie „Iné lieky a Glucose Fresenius Kabi 5 %“).

Všetci pacienti majú byť starostlivo sledovaní. V prípadoch, keď je narušená normálna regulácia obsahu vody v krvi v dôsledku zvýšeného vylučovania vazopresínu, nazývaného aj antidiuretický hormón (ADH), infúzia tekutín s nízkou koncentráciou chloridu sodného (hypotonické tekutiny) môže znížiť hladinu sodíka v krvi (hyponatriémia). Môže to viesť k bolesti hlavy, nevoľnosti, záchvatom, letargii, kóme, opuchu mozgu (edém mozgu) a smrti; preto sú tieto príznaky (akútnej symptomatickej hyponatriemickej encefalopatia) považované za zdravotne naliehavé (pozri tiež časť nižšie „Možné vedľajšie účinky“).

U detí, žien v plodnom veku a u pacientov s ochoreniami mozgu (napr. zápal mozgových blán, krvácanie do mozgu a pomliaždenie mozgu) je mimoriadne riziko závažného a život ohrozujúceho opuchu mozgu spôsobeného akútnou hyponatriémiou.

Počas podávania tohto lieku vám bude lekár monitorovať hladinu cukru v krvi a taktiež vodnú, elektrolytovú rovnováhu a pomer kyslých a zásaditých zložiek v organizme.

Nadmerné podávanie roztokov bez obsahu draslíkového iónu môže spôsobiť zníženú hladinu draslíka v krvi a u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou zadržiavanie sodíka so všetkými následkami.

Nadmerné intravenózne podávanie roztokov glukózy môže spôsobiť zriedenie elektrolytov v krvnom sére, nadbytok vody v organizme, poruchu rovnováhy kyslých a zásaditých zložiek, prekrvenie orgánov a opuch plúc.

Iné lieky a Glucose Fresenius Kabi 5 %

Ak teraz užívate/používate alebo ste v poslednom čase užívali/používali, či práve budete užívať/používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Roztoky glukózy sa nesmú podávať súčasne s krvnými preparátmami tou istou infúznou súpravou.

Roztok môže kryštalizovať s nerozpustnými látkami.

Lieky, ktoré spôsobujú zvýšený účinok vazopresínu (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“ vyššie), napr.:

- lieky podporujúce vylučovanie vazopresínu, napr. chlórpropamid (na liečbu cukrovky); klofibrát (na zníženie hladiny tukov v krvi); karbamazepín (na liečbu chorôb centrálneho nervového systému); vinkristín a ifosfamid (na liečbu rakoviny); selektívne inhibítory spätného

vychytávania sérotonínu (na liečbu depresie); antipsychotiká (na liečbu závažných duševných porúch); 3,4-metyléndioxy-N-metamfetamín (omamná a psychotropná látka); narkotiká (lieky na anestéziu alebo na liečbu stredne silnej alebo silnej bolesti);

- lieky zvyšujúce účinok vazopresínu, napr. chlórpropamid (na liečbu cukrovky); nesteroidné protizápalové lieky; cyklofosfamid (na liečbu rakoviny a závažných autoimunitných ochorení);
- lieky, ktoré účinkujú ako vazopresín (tzv. analógy vazopresínu) – dezmpresín a vazopresín (na zníženie tvorby moču); oxytocín (používa sa počas pôrodu alebo po ňom), terlipresín (na zastavenie krvácania z pažerákových varixov).

Ďalšie lieky, ktoré zvyšujú riziko zníženia hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia):

- diuretiká (lieky na zvýšenie tvorby a vylučovania moču),
- lieky proti epilepsii.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradťte sa so svojím lekárom predtým, ako vám podajú tento liek.

Pri podávaní tohto lieku tehotným ženám počas pôrodu sa musí postupovať obzvlášť opatrne, najmä ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom (hormón, ktorý sa môže podať na vyvolanie pôrodu a na kontrolu krvácania), pre riziko zníženia sodíka v krvi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viest' vozidlá a obsluhovať stroje.

Glucose Fresenius Kabi 5 % obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako sa Glucose Fresenius Kabi 5 % podáva

Tento liek je určený na intravenózne použitie (t. j. podáva sa priamo do žily).

Tento liek vám podá zdravotnícky personál. Tento liek budete dostávať infúziou (po kvapkách) priamo do žily.

Dávkovanie závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Maximálna denná dávka:

40 ml glukózy/kilogram telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá 2 g glukózy/kilogram telesnej hmotnosti/deň.

Maximálna rýchlosť infúzie:

5 ml/kilogram telesnej hmotnosti/hodinu, čo zodpovedá 0,25 g glukózy/kilogram telesnej hmotnosti/hodinu.

Ak vám podajú viac Glucose Fresenius Kabi 5 %, ako majú

Dlhodobé a rýchle podávanie infúzií s veľkým objemom môže zapríčiniť opuchy a nadbytok vody v organizme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Dlhodobé a rýchle podávanie infúzií s veľkým objemom môže zapríčiniť opuchy a nadbytok vody v organizme.

Podanie tohto lieku môže zapríčiniť bolesti a podráždenie v mieste vpichu, prípadne ďalšie komplikácie súvisiace s technikou podávania alebo liekom samotným. Zahŕňajú horúčky, infekciu v mieste podania, zápal žíl alebo zápal žil pri ktorom sa tvoria krvné zrazeniny šíriace sa z miesta aplikácie, zvýšenie objemu telovej tekutiny, vyššie ako normálne množstvo cukru v krvi alebo podanie do priestoru mimo cievu. Pri dlhšom podávaní dráždi cievnu výstelku okrajových žíl.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- znížená hladina sodika v krvi (hyponatriémia), čo môže viest k opuchu mozgu (akútnej hyponetrickej encefalopatii), čo sa prejavuje bolesťou hlavy, nevoľnosťou, záchvatmi, malátnosťou a vracaním – tento stav môže spôsobiť závažné, nevratné a život ohrozujúce poškodenie mozgu.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Glucose Fresenius Kabi 5 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že obsah nie je číry, obsahuje častice alebo ak je obal porušený.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Glucose Fresenius Kabi 5 % obsahuje

- Liečivo je glukóza. 1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje 50 g glukózy (čo zodpovedá 55 g monohydrátu glukózy).
- Pomocné látky sú voda na injekcie, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).

Teoretická osmolarita: 278 mosmol/l

pH: 3,5 – 6,5

Ako vyzerá Glucose Fresenius Kabi 5 % a obsah balenia

Glucose Fresenius Kabi 5 % je číry bezfarebný roztok.

Dodáva sa v:

a./ Sklenená fl'aša - typ II, gumová zátka, hliníkový uzáver, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 20 x 100 ml

16 x 200 ml

12 x 250 ml, 16 x 250 ml

12 x 400 ml

12 x 500 ml

b./ PVC vak s označením a zariadenie pre infúziu, uzatvorené v PE fólii, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 40 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

10 x 1 000 ml

4 x 2 000 ml

5 x 3 000 ml

2 x 5 000 ml

c./ Flaša KabiPac – polyetylénová flaša (LDPE), plastový uzáver, etiketa, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 10 x 100 ml, 20 x 100 ml, 40 x 100 ml

10 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml

10 x 500 ml, 20 x 500 ml

10 x 1 000 ml

d./ Vak freeflex – polyolefinový vak, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml

40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml

20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml

15 x 500 ml, 20 x 500 ml

8 x 1 000 ml, 10 x 1 000 ml

e./ Vak freeflex+ – polyolefinový vak, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa

Veľkosť balenia: 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml

40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml

20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml

15 x 500 ml, 20 x 500 ml

8 x 1 000 ml, 10 x 1 000 ml

f./ Vak freeflex ProDapt – polyolefinový vak, písomná informácia pre používateľa, kartónová škatuľa

Veľkosť balenia: 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml

40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml

20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre 41,37063 Isola della Scala (Verona), Taliansko

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius str 1, 61169 Friedberg, Nemecko

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Poľsko

Fresenius Kabi France, Rue du Remparts 6, 27400 Louviers, Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2024 .

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Dávkovanie

Všeobecné odporúčania:

Pred podávaním a počas neho môže byť potrebné sledovať rovnováhu tekutín, glukózu v sére, sérový sodík a iné elektrolyty, najmä u pacientov so zvýšeným neosmotickým uvoľňovaním vazopresínu (syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretickeho hormónu, SIADH – syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) a u pacientov súbežne liečených agonistami vazopresínu kvôli riziku hyponatriémie.


Monitorovanie sérového sodíka je zvlášť dôležité u liekov s nižšou koncentráciou sodíka v porovnaní s koncentráciou sérového sodíka. Po infúzii Glucose Fresenius Kabi 5 % dochádza k rýchlemu transportu glukózy do buniek tela, čo vedie k účinku, ktorý možno považovať za zdroj voľnej vody a môže viest' k závažnej hyponatriémii.

Návod na použitie fl'aše KabiPac



Tieto inštrukcie slúžia ako návod na manipuláciu s balením.




Pri príprave lieku treba dodržiavať zásady práce za aseptických podmienok.


Všeobecná príprava



- Skontrolujte, či ide o požadovaný infúzny roztok.
- Skontrolujte dátum exspirácie, či je roztok číry a fl'aša nepoškodená.

 <p>a) b)</p>	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte príslušný port na plánovaný spôsob podania:<ol style="list-style-type: none">šípka smerujúca dovnútra infúznej fl'aše = injekčný port,šípka smerujúca von z infúznej fl'aše = infúzny port.
	<ul style="list-style-type: none">Kryt portu ľahko odlomíte zatlačením palcom smerom dozadu v mieste nad šípkami.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
Príprava infúzie	
 <p>b)</p>	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte infúzny port b) (šípka smerujúca von z infúznej fl'aše).Otvorte infúzny port zatlačením palcom dozadu v mieste nad šípkami.

	<ul style="list-style-type: none">Odporúčanie: Používajte štandardný ISO infúzny set bez vzduchového ventilu.Ak infúzny set má vzduchový ventil, má zostať zatvorený.Valcovú svorku ponechajte otvorenú (stav pri dodaní z výroby).Infúznu flášu držte vo zvislej polohe a membránu infúzneho portu prepichnite uprostred vyznačeného kolieska zatlačením vertikálne do hrotu.Odporúčanie: Pri prepichovaní robte mierne rotačný pohyb.Valcovú svorku uzavrite.
	<ul style="list-style-type: none">Infúznu flášu zaveste na infúzny stojan.Kvapkovú komôrku naplňte až po značku (priблиžne do polovice).Naplňte infúzny set.Infúznu súpravu pripojte k žilovému prístupu u pacienta.Nastavte rýchlosť prietoku.
Voliteľné: Pridanie lieku, napr. aplikácia lieku pomocou injekčnej striekačky	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte injekčný port a) (šípka smerujúca dovnútra infúznej fláše).Otvorte injekčný port zatlačením palcom dozadu v mieste nad šípkami.




- Používajte výhradne injekčné ihly s veľkosťou kanyly 18 – 23 G (odporúčame 19 G).
- Injekčnú ihlu vpichnite kolmo do stredu injekčného portu.
- Aplikujte liek do infúznej fľaše KabiPac.
- Roztok starostlivo premiešajte.

Návod na použitie vaku freeflex


Tieto inštrukcie slúžia ako návod na manipuláciu s balením.

Pri príprave lieku treba dodržiavať zásady práce za aseptických podmienok.



Všeobecná príprava




- Skontrolujte, či ide o požadovaný infúzny roztok.
- Skontrolujte dátum exspirácie, či je roztok číry a vak nepoškodený.



	<ul style="list-style-type: none">• Vonkajší ochranný obal odstráňte tesne pred použitím.
 <p>a) b)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Identifikujte príslušný port pre zamýšľaný spôsob podania:<ul style="list-style-type: none">a) šípka smerujúca dovnútra infúzneho vaku = biely injekčný port,b) šípka smerujúca von z infúzneho vaku = tmavomodrý infúzny port.

Príprava infúzie	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte tmavomodrý infúzny port b) (šípka smerujúca von z infúzneho vaku).Roztok môžete použiť len vtedy, ak je číry a balenie nepoškodené.
	<ul style="list-style-type: none">Odlomte kryt tak, že tmavomodrý infúzny port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte kryt smerom dozadu.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">Odporučanie: Používajte štandardný ISO infúzny set bez vzduchového ventilu.Ak infúzny set má vzduchový ventil, má zostať zatvorený.Valcovú svorku ponechajte otvorenú (stav pri dodaní z výroby).Pri ležiacom infúznom vaku prepichnite tmavomodrý infúzny port zatlačením hrotu kolmo do stredu portu.Valcovú svorku uzavrite.
	<ul style="list-style-type: none">Infúzny vak zaveste na infúzny stojan.Kvapkovú komôrku naplňte až po značku (pričíne do polovice).Naplňte infúzny set.Infúzny set pripojte k žilovému prístupu u pacienta.Nastavte rýchlosť prietoku.

Voliteľné: Pridanie lieku: Aplikácia lieku pomocou transfer adaptéra	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte biely injekčný port a) (šípka smerujúca dovnútra vaku).
	<ul style="list-style-type: none">Odlomte kryt tak, že biely injekčný port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte na kryt smerom dozadu.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">Užšiu stranu transfer adaptéra freeflex nasadťte na biely injekčný port až po prvú západku.Spička injekčnej ihly sa teraz nachádza v sterilnej komore, ktorá chráni pred kontamináciou.

	<ul style="list-style-type: none">• Pripravte flăštičku s liekom a nasadťte ju na transfer adaptér freeflex.
	<ul style="list-style-type: none">• Transfer adaptér freeflex v bielom injekčnom porte zasuňte ďalej až po druhú západku a prepichnite vnútornú membránu.
	<ul style="list-style-type: none">• Vak obráťte tak, aby bol hore a flăštička s liekom dole. Stláčaním vaku vtláčajte do flăštičky infúzny roztok.• Liek vo flăštičke opatrným pretrepaním premiešajte.



	<ul style="list-style-type: none">Vak obráťte tak, aby bola fláštička s liekom hore a vak dole. Stláčaním vaku vytláčajte do fláštičky vzduch, aby sa roztok z fláštičky dostal do vaku.Postup opakujte, kým sa celý obsah fláštičky nedostane do vaku a liek nebude dôkladne premiešaný.
	<ul style="list-style-type: none">Po premiešaní fláštičku aj transfer adaptér z infúzneho vaku opatrne odpojte.Na biely injekčný port a) nasadťte červený kryt freeflex, čo znamená, že do roztoku bol pridaný liek.Predíde sa tak ďalšiemu pridávaniu liekov a kontaminácii injekčného portu.
<p>Voliteľné: Pridanie lieku, napr. aplikácia lieku pomocou injekčnej striekačky</p>	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte biely injekčný port a) (šípka smerujúca dovnútra vaku).



	<ul style="list-style-type: none">• Odlomte kryt tak, že biely injekčný port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte na kryt smerom dozadu.• Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">• Odporúčanie: Pred pridaním lieku odstráňte z infúzneho vaku vzduch, aby sa zabezpečilo beztlakové pridanie.• Používajte výhradne injekčné ihly veľkosti 18 – 23 G (odporúčame veľkosť 19 G).• Injekčný port držte až za chráničom prstov.• Pripravte si injekčnú striekačku a ihlu vpichnite kolmo do stredu bieleho injekčného portu.• Liek z injekčnej striekačky aplikujte do infúzneho vaku freeflex.
 <p>a)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Po aplikácii vyberte injekčnú striekačku z infúzneho vaku a roztok s liekom dôkladne premiešajte.• Na biely injekčný port a) nasadťte červený kryt freeflex, čo znamená, že do roztoku bol pridaný liek.• Zabráňte tak ďalšiemu pridávaniu liekov akontaminácii injekčného portu.




Návod na použitie vaku freeflex+




Tieto inštrukcie slúžia ako návod na manipuláciu s balením.

Pri príprave lieku treba dodržiavať zásady práce za aseptických podmienok.

Všeobecná príprava	
	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či ide o požadovaný infúzny roztok.Skontrolujte dátum exspirácie, či je roztok číry a vak nepoškodený.
	<ul style="list-style-type: none">Vonkajší ochranný obal odstráňte tesne pred použitím.
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte príslušný port na plánovaný spôsob podania:<ol style="list-style-type: none">šípka smerujúca dovnútra infúzneho vaku = svetlomodrý injekčný portšípka smerujúca von z infúzneho vaku = tmavomodrý infúzny port

Príprava infúzie	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte tmavomodrý infúzny port b) (šípka smerujúca von z infúzneho vaku).Roztok môžete použiť len vtedy, ak je číry a balenie nepoškodené.
	<ul style="list-style-type: none">Odlomte kryt tak, že tmavomodrý infúzny port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte na kryt smerom dozadu.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">Odporučanie: Používajte štandardný ISO infúzny set bez vzduchového ventilu.Ak infúzny set má vzduchový ventil, má zostať zatvorený.Valcovú svorku ponechajte otvorenú (stav pri dodaní z výroby).Na ležiacom infúznom vaku prepichnite tmavomodrý infúzny port zatlačením hrotu kolmo do stredu portu.Valcovú svorku uzavrite.
	<ul style="list-style-type: none">Infúzny vak zaveste na infúzny stojan.Kvapkovú komôrku naplňte až po značku (pričíne do polovice).Naplňte infúzny set.Infúzny set pripojte k žilovému prístupu u pacienta.Nastavte rýchlosť prietoku.

Voliteľné: Pridanie lieku: Aplikácia lieku pomocou transfer adaptéra	
	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte svetlomodrý injekčný port a) (šípka smerujúca dovnútra infúzneho vaku).
	<ul style="list-style-type: none">Odlomte kryt tak, že svetlomodrý injekčný port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte na kryt smerom dozadu.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">Konektor Luer Lock transfer adaptéra freeflex+ spojte so svetlomodrým injekčným portom.Svetlomodrý injekčný port s transfer adaptérom freeflex+ držte vo vzpriamenej polohe, aby obsah nemohol vytokať.
	<ul style="list-style-type: none">Pripravte fläštičku s liekom a nasadťte ju na transfer adaptér freeflex+.

	<ul style="list-style-type: none">• Poistný krúžok transfer adaptéru posuňte smerom k fl'aštičke s liekom, kým nezapadne – fl'aštička sa zafixuje.
	<ul style="list-style-type: none">• Vak obráťte tak, aby bol hore a fl'aštička s liekom dole. Stláčaním vaku vytláčajte do fl'aštičky infúzny roztok.• Liek vo fl'aštičke opatrnlým pretrepaním premiešajte.
	<ul style="list-style-type: none">• Vak obráťte tak, aby bola fl'aštička s liekom hore a vak dole. Stláčaním vaku vytláčajte do fl'aštičky vzduch, aby sa roztok z fl'aštičky dostal do vaku.• Postup opakujte, kým sa celý obsah fl'aštičky nedostane do vaku a liek nebude dôkladne premiešaný.
	<ul style="list-style-type: none">• Po premiešaní fl'aštičku a transfer adaptér z infúzneho vaku opatrne odpojte.• Na svetlo modrý injekčný port a) nasadte červený kryt freeflex+, čo znamená, že do roztoku bol pridaný liek.• Predíde sa tak ďalšiemu pridávaniu liekov a kontaminácii injekčného portu.

Voliteľné: Pridanie lieku, napr. aplikácia lieku pomocou injekčnej striekačky Luer Lock

	<ul style="list-style-type: none">Identifikujte svetlomodrý injekčný port a) (šípka smerujúca dovnútra vaku).
	<ul style="list-style-type: none">Odlomte kryt tak, že svetlomodrý injekčný port uchopíte jednou rukou a druhou rukou zatlačíte na kryt smerom dozadu.Nie je nutné membránu dezinfikovať hned po odlomení krytu.
	<ul style="list-style-type: none">Odporúčanie: Pred pridaním lieku odstráňte z infúzneho vaku vzduch, aby sa zabezpečilo beztlakové pridanie.Svetlomodrý injekčný port držte až za chráničom prstov.Konektor injekčnej striekačky Luer Lock spojte so svetlomodrým injekčným portom.Liek z injekčnej striekačky aplikujte do infúzneho vaku freeflex+.
	<ul style="list-style-type: none">Po aplikácii vyberte injekčnú striekačku z infúzneho vaku a roztok s liekom dôkladne premiešajte.Na svetlomodrý injekčný port a) nasadťte červený kryt freeflex+, čo znamená, že do roztoku bol pridaný liek.Predíde sa tak ďalšiemu pridávaniu liekov a kontaminácii injekčného portu.