

Písomná informácia pre používateľa

Solutio Jarisch 20 mg/g dermálny roztok

kyselina boritá

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Solutio Jarisch a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Solutio Jarisch
3. Ako používať Solutio Jarisch
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Solutio Jarisch
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Solutio Jarisch a na čo sa používa

Solutio Jarisch je zriedený roztok kyseliny boritej. Pre mierne dezinfekčné, protizápalové a keratoplastické (podpora rastu vrchnej vrstvy kože) účinky sa používa na ukladnenie podráždenej kože pri kožných ochoreniach, spareninách, akútnom ekzéme, na doliečenie po ošetrení bežných foriem *condyloma acuminata* (bradavice v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a konečníka).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Solutio Jarisch

Nepoužívajte Solutio Jarisch

- ak ste alergický na kyselinu boritú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- u detí mladších ako 10 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Solutio Jarisch, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Aby sa predišlo zvýšenému vstrebávaniu kyseliny boritej, nenanášajte tento liek na veľké plochy zapálenej, macerovanej (rozmokvanej) alebo obnaženej kože, na sliznicu a do očí.

Iné lieky a Solutio Jarisch

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neuskutočnili sa štúdie, ktoré by sledovali, či Solutio Jarisch ovplyvňuje účinok iných liekov alebo naopak.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia v prípadoch uvedených v časti 1.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá vplyv na pozornosť a koncentráciu a neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Solutio Jarisch

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek sa má používať iba na kožu.

Nanáša sa 1- až 3-krát denne na postihnuté miesta vo forme obkladu. Obklad sa prikladá na 10 až 15 minút.

Ak liek používate opakovane, je potrebné fľašu okamžite a poriadne zatvoriť – tým sa liek ochráni pred možným znečistením.

Ak použijete viac lieku Solutio Jarisch, ako máte

Pri nanášaní tohto lieku na väčšiu plochu zapálenej, macerovanej (rozmočenej) alebo obnaženej kože alebo prehltnutí tohto lieku je riziko vstrebania kyseliny boritej.

V závislosti od vstrebaného množstva sa môže dostaviť nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť hlavy, nízky krvný tlak, príznaky dehydratácie.

Ak dôjde k predávkovaniu kyselinou boritou v dôsledku zvýšeného vstrebania cez kožu, je potrebné dôkladne umývať kožu 15 minút teplou vodou a mydlom.

Pri prehltnutí je potrebné vyvolať vracanie, urobiť výplach žalúdka teplou vodou alebo podať aktívne uhlie a doplniť tekutiny.

Ak ťažkosti pretrvávajú, kontaktujte lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

- pálenie, podráždenie, začervenanie v mieste aplikácie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Solutio Jarisch

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajújte pri teplote do 25 °C. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na etikete na plastovej fľaši pod označením „Dátum expirácie“.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Solutio Jarisch obsahuje

- Liečivo je kyselina boritá. 1 g dermálne ho roztoku obsahuje 20 mg kyseliny boritej.
- Ďalšie zložky sú glycerol 85 %, čistená voda.

Ako vyzerá Solutio Jarisch a obsah balenia

- Číra, bezfarebná tekutina bez zápachu v bielej plastovej (HDPE) fľaši s plastovým (PP/PE) uzáverom, na ktorej je etiketa a písomná informácia pre používateľa vo forme otváracej etikety. Fľaša nie je zabalená v škatuli.
- Veľkosť balenia: 100 g, 200 g a klinické balenie 1 000 g.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 32 181 111
e-mail: info@vulm.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2021.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk).