

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **Mobilat dermálny gél**

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Mobilat a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mobilat
3. Ako používať Mobilat
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mobilat
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Mobilat a na čo sa používa**

Mobilat gél zabezpečuje pri ťažkostiach a bolestiach zo strany pohybového ústrojenstva dlhodobý liečivý účinok priamo v postihnutom tkanive. Liečebný proces je priaznivo ovplyvnený osvedčenou kombináciou vysoko účinných liečiv.

Mobilat gél tlmí zápal v tkanive a spôsobuje rýchly ústup opuchov. Súčasne podporuje prekrvenie a tým zlepšuje výmenu látok a regeneráciu tkaniva. Liečba Mobilatom vedie k zmierneniu bolesti a k obnoveniu pohyblivosti. Mobilat gél sa vyznačuje vysokou úrovňou kvality. Ľahko sa vstrebáva a výborne ho znášajú i pacienti s citlivou pokožkou, príjemný chladivý účinok gélu je cítiť ihneď po nanosení na kožu.

Pri stuhnutí svalov, ramenných kĺbov, svalovom reumatizme, zápalových ochoreniach kĺbov, artrózach.

Používajte Mobilat gél pri podvrtnutiach, pomliaždeninách, natiahnutí šliach, reaktívnych výpotkoch a bolestiach pri pohyboch.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mobilat**

##### **Neužívajte Mobilat**

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Nepoužívajte Mobilat gél pri známej precitlivenosti (alergii) na salicyláty. Len keď vám to váš lekár výslovne povolí, môžete Mobilat gél použiť u ovčích kiahní, reakcii po očkovaní, bakteriálnych a hubových kožných infekcií a špecifických kožných procesov (napr. tuberkulóza, syfilis a pod.). Toto isté platí aj o použití na veľké plochy kože počas dlhšej doby v tehotenstve, u dojčiat a malých detí ako aj u pacientov s poškodenými obličkami.

##### **Iné lieky a Mobilat**

Vzájomné pôsobenie Mobilatu s inými liekmi nebolo dosiaľ pozorované.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

### **Mobilat obsahuje propylénglykol**

Tento liek obsahuje 8 g propylénglykolu (E 1520) v 100 g gélu. Propylénglykol môže spôsobiť podráždenie kože.

### **3. Ako používať Mobilat**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Pokiaľ vám lekár nepredpísal ináč, naneste na postihnuté miesto raz alebo viackrát denne prúžok Mobilat gélu a ľahko ho vmasírujte do kože. Mobilat gél obsahuje alkohol (izopropylalkohol), a preto by nemal prísť do styku s otvorenými ranami, očami a sliznicou.

Mobilat gél sa osvedčil aj v kombinácii s fyzikálnymi liečebnými metódami ako aj iono- a fonoforéza (u ionoforézy je nanášaný Mobilat pod katódu).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť lokálne kožné reakcie ako podráždenie, ojedinele i kontaktné alergie.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

### **5. Ako uchovávať Mobilat**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25° C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

#### **Čo Mobilat obsahuje**

- Liečivá sú glykozaminoglykán polysulfát 0,2 g, kyselina salicylová 2,0 g, extrakt z kôry nadobličiek 1,0 g v 100 g gélu.

- Ďalšie zložky sú dihydrát edetanu disodného, rozmarínová silica, olamín, kyselina polyakrylová, propylénglykol, izopropylalkohol, čistená voda.

#### **Ako vyzerá Mobilat a obsah balenia**

Hliníková tuba s obsahom 50 g alebo 100 g gélu v jednej tube  
Fólia, ktorá prekrýva otvor tuby, sa jednoducho prepichne trňom v uzávere.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

##### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 – 18  
61118 Bad Vilbel, Nemecko

##### Výrobca

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Nemecko  
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Nemecko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2021.**