

Písomná informácia pre používateľa

Preimmun

perorálne roztokové kvapky

materská tinktúra z celých čerstvých rastlín echinacey úzkolistej a/alebo echinacey bledej

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Preimmun a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Preimmun
3. Ako užívať Preimmun
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Preimmun
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Preimmun a na čo sa používa

Preimmun sa užíva na posilnenie imunity a ako prevencia infekčných chorôb.

Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Preimmun

Neužívajte Preimmun

- ak ste alergický na echinaceu úzkolistú a/alebo echinaceu bledú alebo na rastliny z čeľade astrovitých (Compositae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Nie je odporúčané užívať tento liek pri výskyte progresívnych systémových ochorení, ochorení imunitného systému, pri imunodeficiencii (imunologická nedostatočnosť), imunosupresii (potlačenie, zníženie imunity, obranyschopnosti organizmu) a pri ochorení bielej krvnej zložky (biele krvinky-bunková zložka imunitného systému).

Ak sa počas užívania lieku príznaky zhoršujú alebo sa vyskytne vysoká teplota, poraďte sa s lekárom.

Ak ste citlivý jedinec, môže sa vyskytnúť vznik alergickej reakcie. Pred začatím užívania echinacei sa poraďte s lekárom.

Ak ste atopický pacient, je u vás možné riziko anafylaktickej reakcie. Pred začatím užívania echinacei sa poraďte s lekárom.

Deti a dospelávajúci

Užívanie u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča pre nedostatok potrebných údajov.

Iné lieky a Preimmun

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ďalšie informácie pozri v časti „Preimmun obsahuje etanol (alkohol).“

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pre chýbanie potrebných údajov sa užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Nie sú dostupné údaje vplyvu na plodnosť.

Ďalšie informácie pozri v časti „Preimmun obsahuje etanol (alkohol).“

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liek obsahuje alkohol (pozri časť „Preimmun obsahuje etanol (alkohol).“).

Preimmun obsahuje etanol (alkohol).

Tento liek obsahuje 395 mg etanolu (alkohol) v 1 ml, čo zodpovedá 422 mg/g. Množstvo v 50 kvapkách tohto lieku zodpovedá 23 ml piva alebo 9 ml vína.

Je nepravdepodobné, že množstvo alkoholu v tomto lieku bude mať vplyv na dospelých a dospelávajúcích, ani že alkohol bude mať pozorovateľný vplyv na deti. Môže mať nejaké účinky na mladšie deti, napríklad ospalosť.

Alkohol v tomto lieku môže meniť účinky ďalších liekov. Poradíte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, ak užívate iné lieky.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poradíte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste závislý od alkoholu, poradíte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

3. Ako užívať Preimmun

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov:

Na prevenciu 3 krát denne 20 - 30 kvapiek.

V prípade akútnej infekcie najskôr 50 kvapiek a potom každú hodinu 10 - 20 kvapiek.

Použitie u detí a dospelávajúcích

Užívanie u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča pre nedostatok potrebných údajov.

Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Ponechajte liek v ústach počas krátkej doby bez prežúvania.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní počas užívania lieku, musíte sa poradiť s lekárom. Liečbu začnite pri prvých príznakoch bežného prechladnutia.

Ak užijete viac Preimmun, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom do 12 rokov sa poradíte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Preimmun

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môže sa vyskytnúť hypersenzitívnosť (precitlivosť - kožné reakcie).
Frekvencia výskytu nie je známa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Preimmun

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Zákal alebo usadenina neovplyvňujú účinnosť lieku.
Pred použitím potraste.

Uchovávajte pri teplote 15°C – 25°C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP:“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Preimmun obsahuje

v 100 g perorálnych roztokových kvapiek:

- Liečivo je 33,3 g materská tinktúra z celých čerstvých rastlín echinacey úzkolistej a/alebo echinacey bledej (*Echinacea angustifolia* DC. a/alebo *Echinacea pallida* Nutt.).
- Pomocné látky sú: etanol 96 % V/V, čistená voda

Ako vyzerá Preimmun a obsah balenia

Svetlá žltozelená tekutina s aromatickým zápachom a charakteristickou pálivou chuťou v okrúhlej fľaštičke z hnedého skla s kvapkovacím uzáverom a etiketou. Zákal alebo usadenina neovplyvňujú účinnosť lieku.

Obsah balenia: 50 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstrasse 10
66424 Homburg
Nemecko

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/01669-ZME, 2018/05364-ZME

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2022.