

**Túto informáciu si uschovajte
a ukážte ju aj ďalším zdravotníckym
pracovníkom zapojeným do vašej
zdravotnej starostlivosti alebo liečby.**

Vaše meno

Meno lekára (ktorý predpísal Olumiant)

Tel. číslo lekára

ŠÚKL schválil: máj 2023; verzia 4.0

KARTA PACIENTA

Informácia pre pacienta OLUMIANT® (baricitinib)

*Tento dokument obsahuje dôležité
informácie, ktoré by ste mali vedieť
pred liečbou Olumiantom a počas nej.*

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2A
821 08 Bratislava
Tel.: +421 220 663 111

The Lilly logo, featuring the word "Lilly" in a red, cursive script font.

Tehotenstvo:

- Neužívajte Olumiant, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná.
- Počas liečby Olumiantom používajte účinnú antikoncepciu (ešte aj 1 týždeň po ukončení liečby).
- Ak otehotníete (alebo ak plánujete tehotenstvo), okamžite to povedzte ošetrojúcemu lekárovi.

Infekcie:

Olumiant môže zhoršiť prítomnú infekciu alebo zvýšiť riziko novej infekcie, alebo zvýšiť možnosť reaktívacie vírusu. Ak máte cukrovku, alebo ste starší ako 65 rokov, môžete byť náchylnejší na rozvoj infekcií. Ak sa infekcia nelieči, môže sa stať závažnou.

Ihneď oznámte ošetrojúcemu lekárovi, ak sa u vás objavia príznaky infekcie, akými sú napr.:

- horúčka, rany, pocit väčšej únavy ako zvyčajne alebo problémy so zubami.
- kašeľ, ktorý neprechádza, nočné potenie a strata hmotnosti. Môžu to byť príznaky tuberkulózy (infekčného ochorenia pľúc).
- bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi.
Môže to byť prejav infekcie herpes zoster.

Nemelanómové nádorové ochorenia kože:

- U pacientov užívajúcich Olumiant boli pozorované nemelanómové nádorové ochorenia kože. Ak sa počas liečby alebo po liečbe objavia nové kožné ložiská alebo ak existujúce ložiská zmenia vzhľad, povedzte to svojmu lekárovi.

Krvné zrazeniny:

Olumiant vám môže spôsobovať tvorbu krvných zrazenín v končatinách, ktoré sa môžu presunúť do pľúc. Hneď ako spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite o tom informujte svojho lekára:

- opuch alebo bolesť jednej nohy, alebo ruky
- pocit tepla alebo začervenanie jednej nohy, alebo ruky
- nečakaná dýchavičnosť
- zrýchlené dýchanie
- bolesť na hrudi.

Srdcový infarkt alebo cievná mozgová príhoda:

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

- silná bolesť alebo tlak na hrudníku (ktorá sa môže rozšíriť do rúk, čeluste, šije, chrbta)
- dýchavičnosť
- studený pot
- jednostranná slabosť v ruke a/alebo nohe
- nezreteľná reč

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. Akékoľvek vedľajšie účinky, chyby v liečbe alebo sťažnosti týkajúce sa výrobkov spoločnosti Eli Lilly, hláste prosím na bezplatnom čísle **0800 112 122** alebo e-mailom na **phv_czsk@lilly.com** Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: **+421 2 5070 1206**, e-mail: **neziaduce.ucinky@sukl.sk** Elektronický formulár: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>