

▼ BEKEMV® (ekulizumab)

KARTA PACIENTA

▼ BEKEMV je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.



Dôležité informácie o bezpečnosti pre pacienta liečeného liekom BEKEMV

Ukážte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa podieľa na starostlivosti o vaše zdravie.

BEKEMV môže znížiť schopnosť vášho imunitného systému bojovať proti infekciám. Môžu sa rozvinúť závažné infekcie vrátane sepsy, **najmä meningokoková infekcia, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc**. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite zavolajte svojmu lekárovi.

Ak sa vám nepodarí skontaktovať sa so svojím lekárom, choďte do nemocnice na oddelenie urgentného príjmu a ukážte im túto kartu.

- Bolesť hlavy s nevoľnosťou alebo vracaním
- Bolesť hlavy so stuhnutou šíjou alebo stuhnutým chrbtom
- Horúčka (zvýšená teplota)
- Vyrážka
- Zmätenosť
- Bolesť svalov s príznakmi podobnými chrípke
- Oči citlivé na svetlo



Ak máte **niektorý** z týchto príznakov alebo prejavov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte im túto kartu.

Aj keď prestanete používať BEKEMV, túto kartu si ponechajte pri sebe ešte 3 mesiace po poslednej dávke lieku BEKEMV. Riziko meningokokovej infekcie u vás môže pretrvávať ešte dlhý čas po poslednej dávke lieku BEKEMV.

Ak máte vy (alebo vaše dieťa) zriedkavú genetickú poruchu, ktorá sa nazýva dedičná neznášanlivosť fruktózy (skratka HFI, z anglického *hereditary fructose intolerance*), nesmiete vy (alebo vaše dieťa) dostávať tento liek. Pacienti s HFI nedokážu rozložiť fruktózu, čo môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ako sú záchvaty, kóma, oneskorenie rastu (u detí), zlyhanie obličiek a pečene.

KARTA PACIENTA



Informácie pre ošetrojúceho lekára



Tomuto pacientovi bol predpísaný liek BEKEMV (ekulizumab), ktorý zvyšuje náchylnosť pacienta na meningokokovú infekciu (*Neisseria meningitidis*) a iné celkové infekcie.

- Meningokokové infekcie sa môžu stať rýchlo život ohrozujúcimi alebo smrteľnými, ak nie sú včas rozpoznané a liečené.
- **Pri podozrení na infekciu pacienta okamžite vyšetrite a v prípade potreby liečte vhodnými antibiotikami.**
- BEKEMV je kontraindikovaný u pacientov s HFI bez ohľadu na ich vek a u dojčiat a detí mladších ako 2 roky, u ktorých ešte nemusí byť diagnostikovaná HFI.
- Po intravenóznom podaní lieku s obsahom sorbitolu, ako je BEKEMV, sa u pacientov s HFI môže vyskytnúť hypoglykémia, metabolická acidóza, záchvaty, kóma a môže to byť život ohrozujúce. Pri podozrení na HFI okamžite zhodnoťte situáciu a primerane ju liečte.
- Čo najskôr kontaktujte predpisujúceho lekára (kontakt je uvedený nižšie).

Ďalšie informácie o lieku BEKEMV nájdete v úplnom Súhrne charakteristických vlastností lieku, dostupnom na stránke www.sukl.sk alebo zašlite email na slovakiaoffice@amgen.com.



Pacienti, ktorým sa podáva liek BEKEMV, majú mať túto kartu neustále pri sebe.

Meno pacienta _____

Nemocnica, v ktorej sa lieči _____

Meno lekára _____

Tel. číslo _____

Dátum očkovania proti meningokokovej infekcii _____