

# PODLOŽKA NA PRÍPRAVU LIEKU NPLATE®

**Predtým, ako si môžete aplikovať Nplate®, musíte byť vyškolený svojím lekárom.**









## PREDTÝM, AKO ZAČNETE

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny pre používanie.
- Mali by ste si určiť pravidelný rozvrh liečby, aj keď cestujete.
- Uistite sa, že máte všetky pomôcky, ktoré budete potrebovať (pozri obrázky nižšie).
- Skontrolujte dátumy expirácie na všetkých injekčných liekovkách.
- Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie alebo ak bol vystavený izbovej teplote dlhšie ako 30 dní.
- Umyte si ruky mydlom.
- Používajte liehové tampóny na vyčistenie povrchu, kde si budete pripravovať liek.

## POZNÁMKA:

Pri príprave injekcie Nplate® používajte, prosím, túto podložku spolu s príručkou *Krok za krokom* a/alebo Písomnú informáciu pre používateľov a DVD Svojpomocné podávanie. Možno budete potrebovať viac ako jednu injekciu Nplate®. Ak vám váš lekár predpísal viac ako jednu injekciu Nplate®, postupujte podľa krokov definovaných v príručke *Krok za krokom* na dokončenie podania vašej predpísanej dávky lieku pomocou novej súpravy (súprav) na svojpomocné podanie.

**Predtým, ako začnete, sa uistite, že máte nasledujúce pomôcky:**

<b>A</b> Injekčná liekovka s liekom (1) 	<b>B1</b> Piestová tyčinka (1) 	<b>B2</b> Injekčná striekačka naplnená vodou (1) 
<b>C</b> Jednorazová 1 ml injekčná striekačka s Luer-lock (1) 	<b>D</b> Bezpečnostná ihla: 27 G, 13 mm (1) 	
<b>E</b> Adaptér injekčnej liekovky 	<b>F</b> Liehové tampóny (x4) 	<b>G</b> Kontajner pre ostré predmety (1; nie je súčasťou) 

POZNÁMKA: Tieto obrázky slúžia len pre ilustráciu.

Injekčné liekovky s liekom uchovávajú až do použitia v pôvodnej škatulke na ochranu pred svetlom. Tento liek sa môže vybrať z chladničky na maximálne 30 dní pri izbovej teplote (do 25 °C).  
Váš lekár vám môže odporučiť odlišnú ihlu na injekciu.

# VÁŠ PRIESTOR PRE PRÍPRAVU

### **Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky**

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206

e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk)

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

V hlásení, prosím, uveďte aj názov lieku a číslo šarže, ktorá vám bola podaná, ak ho máte k dispozícii.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, e-mail: [eu-sk-safety@amgen.com](mailto:eu-sk-safety@amgen.com), tel.: +421 2 321 114 49.