

Písomná informácia pre používateľa

Sirkava 18 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdej kapsule tiotrópium

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Sirkava 18 mikrogramov a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sirkavu 18 mikrogramov
3. Ako používať Sirkavu 18 mikrogramov
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sirkavu 18 mikrogramov
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Sirkava 18 mikrogramov a na čo sa používa

Sirkava 18 mikrogramov uľahčuje dýchanie pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). CHOCHP je chronické pľúcne ochorenie, ktoré zapríčiňuje dýchavičnosť a kašeľ. CHOCHP je spojená so stavmi chronickej bronchitídy a emfyzémom. Keďže CHOCHP je dlhotrvajúce ochorenie, Sirkava 18 mikrogramov sa má užívať každý deň a nielen vtedy, keď sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP.

Sirkava 18 mikrogramov je dlhodobopôsobiaci bronchodilatátor, ktorý pomáha rozširovať vaše dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie. Pravidelné užívanie Sirkavy 18 mikrogramov vám pomôže, ak máte pretrvávajúcu dýchavičnosť, ktorá súvisí s vaším ochorením, a pomôže minimalizovať vplyv choroby na váš každodenný život. Tiež vám pomôže byť dlhšie aktívny. Každodenné používanie Sirkavy 18 mikrogramov pomáha tiež predchádzať náhlým, krátkodobým zhoršeniam príznakov CHOCHP, ktoré môžu trvať niekoľko dní. Účinok tohto lieku pretrváva 24 hodín, preto ho stačí užívať jedenkrát denne. Správne dávkovanie Sirkavy 18 mikrogramov nájdete v časti 3. Ako používať Sirkavu 18 mikrogramov a pokyny na používanie sú na druhej strane písomnej informácie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sirkavu 18 mikrogramov

Nepoužívajte Sirkavu 18 mikrogramov:

- ak ste alergický (hypersenzitívny) na jeho liečivo, tiotrópium, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste alergický (hypersenzitívny) na atropín alebo jemu podobné liečivá, napr. ipratrópium alebo oxitrópium.

Upozornenia a opatrenia

Poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Sirkavu 18 mikrogramov

- Ak máte glaukóm so zatvoreným uhlom, problémy s prostatou alebo ťažkosti s močením, povedzte to svojmu lekárovi.
- Ak máte problémy s obličkami, prosím, prekonzultujte to s lekárom.
- Sirkava 18 mikrogramov je určená na udržiavaciu liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc, nesmie sa používať na liečbu akútnych záchvatov dýchavičnosti alebo sipotu.
- Po podaní Sirkavy 18 mikrogramov sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie, ako sú vyrážky, opuch, svrbenie, sipot alebo dýchavičnosť. Ak sa vyskytnú, kontaktujte, prosím, ihneď svojho lekára.
- Inhalačné lieky, ako je Sirkava 18 mikrogramov, môžu spôsobiť bezprostredne po inhalácii ťažobu na hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosť. Ak sa vyskytnú, kontaktujte, prosím, ihneď svojho lekára.
- Dávajte pozor, aby inhalačný prášok nevnikol do vašich očí, čo môže viesť k vyvolaniu alebo zhoršeniu glaukómu so zatvoreným uhlom, ktorý je očnou chorobou. Bolesť alebo nepríjemný pocit v očiach, rozmazané videnie, videnie kruhov okolo svetelných zdrojov alebo farebných obrazcov spolu s červenými očami môže byť prejavom akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom. Očné príznaky môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, nevoľnosťou alebo vracaním. Ak sa objavia prejavy a príznaky glaukómu so zatvoreným uhlom, ukončíte používanie tiotrópiumbromidu a okamžite sa poraďte so svojim lekárom, najlepšie s očným lekárom.
- Sucho v ústach, ktoré sa pozorovalo pri anticholinergickej liečbe (liečba znižujúca účinky vyvolané acetylcholínom, látkou, ktorá prenáša nervové vzruchy v tele), môže pri dlhodobom používaní viesť ku vzniku zubného kazu. Preto nezabudnite venovať pozornosť ústnej hygiene.
- Informujte svojho lekára v prípade, že ste za posledných 6 mesiacov prekonali infarkt myokardu alebo stav akejkoľvek nestabilnej alebo život ohrozujúcej nepravidelnej činnosti srdca alebo závažné zlyhávanie srdca v priebehu uplynulého roka. Je dôležité zhodnotiť, či Sirkava 18 mikrogramov je pre vás vhodným liekom.
- Sirkavu 18 mikrogramov nepoužívajte častejšie než jedenkrát denne.

Deti a dospelí

Sirkava 18 mikrogramov sa neodporúča deťom a dospelým do 18 rokov.

Iné lieky a Sirkava 18 mikrogramov

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste užívali alebo užívate podobné lieky na ochorenie pľúc, napr. ipratrópium alebo oxitrópium.

Pri súbežnom používaní Sirkavy 18 mikrogramov s inými liekmi používanými na liečbu CHOCHP, ako sú úľavové inhalačné lieky, napr. salbutamol, metylxantíny, napr. teofylín, a/alebo perorálne (užívané ústami) a inhalačné steroidy, napr. prednizón, neboli hlásené špecifické vedľajšie účinky.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak sa plánujete otehotniť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Tento liek nemáte používať, ak vám to vyslovene neodporučí váš lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Výskyt závratov, rozmazaného videnia alebo bolesti hlavy môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Sirkava 18 mikrogramov obsahuje laktózu

Ak dodržiavate odporúčané dávkovanie, jedna kapsula jedenkrát denne, každá dávka obsahuje 5,5 mg laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.

3. Ako používať Sirkavu 18 mikrogramov

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je inhalácia obsahu 1 kapsuly (18 mikrogramov tiotropia) jedenkrát denne. Nepoužívajte vyššiu dávku ako je odporúčaná dávka.

Sirkava 18 mikrogramov sa neodporúča deťom a dospelým do 18 rokov.

Pokúste sa používať kapsulu každý deň v rovnakom čase. Je to dôležité, pretože účinok Sirkavy 18 mikrogramov pretrváva 24 hodín.

Kapsuly sú určené iba na inhaláciu, a nie na užitie ústami.

Kapsuly neprehltajte.

Pomôcka NeumoHaler, do ktorej máte vložiť kapsulu Sirkavy, vytvorí v kapsule otvor a umožní tak vdýchnutie prášku.

Uistite sa, či máte NeumoHaler a či ho môžete správne používať. Návod na používanie NeumoHaleru sa nachádza na konci tejto písomnej informácie.

Uistite sa, že ste do NeumoHaleru nevdýchli.

Ak máte akékoľvek problémy s používaním pomôcky NeumoHaler, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom, ktorí vám ukážu, ako pomôcku používať.

NeumoHaler máte čistiť raz za mesiac. Návod na čistenie NeumoHaleru sa nachádza na konci tejto písomnej informácie.

Pri používaní Sirkavy 18 mikrogramov dávajte pozor, aby vám prášok nevnikol do očí. Ak sa prášok dostane do vašich očí, môže sa u vás vyskytnúť rozmazané videnie, bolesť v očiach a/alebo červené oči, okamžite si vypláchnite oči teplou vodou. Potom sa okamžite poraďte so svojím lekárom.

Ak cítite, že sa vám dýchanie zhoršuje, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.

Ak použijete viac Sirkavy 18 mikrogramov, ako máte

Ak inhalujete viac ako 1 kapsulu Sirkavy 18 mikrogramov denne, máte to okamžite oznámiť svojmu lekárovi. Môžete mať vyššie riziko vzniku vedľajších účinkov, ako je sucho v ústach, zápcha, ťažkosti s vylučovaním moču, zrýchlená srdcová frekvencia alebo rozmazané videnie.

Ak zabudnete použiť Sirkavu 18 mikrogramov

Ak si zabudnete podať dávku, podajte si ju hneď ako si spomeniete, ale neinhaliujte dve dávky naraz, alebo v ten istý deň. Ďalšiu dávku potom inhaliujte ako obvykle.

Ak prestanete používať Sirkavu 18 mikrogramov

Predtým ako prestanete používať Sirkavu 18 mikrogramov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak prestanete používať Sirkavu 18 mikrogramov, prejavy a príznaky CHOCHP sa môžu zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u ľudí, ktorí používali tento liek a sú uvedené podľa častosti výskytu, ako časté, menej časté, zriedkavé alebo neznáme.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- sucho v ústach: je obvykle mierne.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- závrat;
- bolesť hlavy;
- poruchy vnímania chuti;
- rozmazané videnie;
- nepravidelný srdcový rytmus (fibrilácia predsieni);
- zápal hrdla (faryngitída);
- zachrípnutie (dysfónia);
- kašeľ;
- pálenie záhy (gastroezofágová refluxová choroba);
- zápcha;
- hubová infekcia ústnej dutiny a hrdla (kandidóza orofaryngu);
- vyrážka;
- ťažkosti pri močení (retencia moču);
- bolestivé močenie (dyzúria).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- nespavosť (insomnia);
- videnie kruhov okolo svetelných zdrojov alebo farebných obrazov spolu s červenými očami (glaukóm);
- zvýšený vnútroočný tlak;
- nepravidelný srdcový rytmus (supraventrikulárna tachykardia);
- zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia);
- pocit búšenia srdca (palpitácie);
- tlak na hrudi, sprevádzaný kašľom, sipotom alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus);

- krvácanie z nosa (epistaxa);
- zápal hrtana (laryngitída);
- zápal prínosových dutín (sinusitída);
- upchatie alebo zastavenie pohybov čriev (intestinálna obštrukcia vrátane paralytického ilea);
- zápal ďasien (gingivitída);
- zápal jazyka (glositída);
- ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia);
- zápal úst (stomatitída);
- pocit na vracanie (nauzea);
- precitlivosť, vrátane okamžitých reakcií precitlivosti;
- závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre a hrtanu (angioedém);
- žihľavka (urtikária);
- svrbenie (pruritus);
- infekcie močových ciest.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- zníženie množstva vody v tele (dehydratácia);
- zubný kaz;
- závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia);
- infekcie alebo tvorba vredov na koži;
- suchá pokožka;
- opuch kĺbov.

Po podaní Sirkavy 18 mikrogramov sa môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky vrátane alergických reakcií, samostatne alebo ako súčasť závažnej alergickej reakcie (anafylaktická reakcia), ktoré spôsobujú opuch tváre alebo hrdla (angioedém) alebo iné reakcie precitlivosti (ako sú náhle zníženie krvného tlaku alebo závrat). Okrem toho, tak ako pri používaní iných inhalačných liekov, niektorí pacienti môžu spozorovať neočakávanú ťažobu na hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus). Ak sa akýkoľvek z týchto príznakov vyskytne, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Sirkavu 18 mikrogramov

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Vašu pomôcku NeumoHaler môžete používať, kým nevyužijete celý liek v škatuľke (najdlhšie 3 mesiace).

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sirkava 18 mikrogramov obsahuje

Liečivo je tiotropium. Každá kapsula obsahuje 18 mikrogramov liečiva tiotropium (ako bezvodý tiotropiumbromid). Pri inhalácii opustí náustok inhalátora NeumoHaler 12 mikrogramov tiotropia. Ďalšie zložky sú laktóza, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), čierny atrament.

Ako vyzerá Sirkava 18 mikrogramov a obsah balenia

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule.

Biele alebo takmer biele kapsuly označené T18 čiernou farbou na vrchnáku, obsahujúce biely alebo takmer biely prášok.

ALU/ALU-PVC odlupovací blister.

NeumoHaler je pomôcka na inhaláciu jednej dávky so zeleným telom a krytom a bielym tlačidlom, vyrobená z plastu (ABS – akrylonitril-butadién-styrén) a nehrdzavejúcej ocele.

Liek sa dodáva v týchto veľkostiach balenia a pomôcok:

- papierová škatuľka obsahujúca 30 kapsúl
- papierová škatuľka obsahujúca 60 kapsúl
- papierová škatuľka obsahujúca 90 kapsúl

Pomôcka NeumoHaler je súčasťou každej papierovej škatuľky.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Viatrix Limited

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublín 15

DUBLIN

Írsko

Výrobca

Ferrer Internacional, S.A

Joan Buscallà 1-9

08173 Sant Cugat del Vallès

Španielsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledujúcimi názvami:

Belgicko	Tiotropium Viatrix 18 microgram inhalatiepoeder in harde capsule
Bulharsko	Sirkava 18 микрограма прах за инхалация, твърда капсула
Cyprus	Tiotropium Mylan 18 micrograms κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο
Dánsko	Sirkava
Estónsko	Tiotropium Viatrix
Fínsko	Sirkava
Francúzsko	TIOTROPIUM VIATRIS 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule

Grécko	Tiotropium Mylan 18 micrograms κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο
Holandsko	Tiotropium Viatris 18 microgram, inhalatiepoeder in harde capsules
Chorvátsko	Acopair 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule
Írsko	Tiotropium Viatris 18 micrograms/dose inhalation powder, hard capsule
Island	Sirkava
Lichtenštajnsko	Tiotropium Viatris 18 Mikrogramm, Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation
Litva	Tiotropium bromide Viatris 18 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)
Lotyšsko	Tiotropium Viatris 18 mikrogrami inhalācijas pulveris, cietās kapsulas
Luxembursko	Tiotropium Viatris 18 mcg poudre pour inhalation en gélule
Maďarsko	Tiotropium Viatris 18 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában
Malta	Sirkava 18 microgram inhalation powder, hard capsule
Nemecko	Acopair 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation
Nórsko	Sirkava
Poľsko	Acopair
Portugalsko	Sirkava
Rakúsko	Tiotropium Viatris 18 Mikrogramm, Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation
Rumunsko	Tiotropiu Viatris 18 micrograme pulbere de inhalat capsula
Slovensko	Sirkava 18 mikrogramov
Slovinsko	Tiotropij Viatris 18 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde kapsule
Spojené kráľovstvo	Acopair 18 microgram, inhalation powder, hard capsule
Španielsko	Sirkava 18 microgramos polvo para inhalación (capsula dura)
Švédsko	Sirkava
Taliansko	Sirkava

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2023.


Návod na používanie NeumoHaleru:

Milý pacient,


NeumoHaler vám umožní inhalovať liečivo obsiahnuté v kapsulách Sirkavy – ktoré vám predpísal váš lekár na liečbu vašich problémov s dýchaním.

Pozorne sledujte pokyny na používanie Sirkavy, ktoré vám poskytne lekár. NeumoHaler bol špeciálne vyvinutý pre Sirkavu. Nesmie sa používať na podávanie iných liekov. NeumoHaler môžete používať, pokiaľ nepoužijete celý liek v škatuľke (najdlhšie 3 mesiace). NeumoHaler má ochranný kryt (zaoblené vrchné viečko), náustok (umiestnený pod ochranným krytom), telo, tlačidlo na prepichnutie kapsuly (na boku NeumoHaleru) a stredovú komoru (umiestnenú pod náustkom).

Pomôcka NeumoHaler




- 1 ochranný kryt
- 2 náustok
- 3 telo
- 4 tlačidlo na prepichnutie kapsuly
- 5 stredová komora




1. Odstráňte ochranný kryt. Skontrolujte, či sa v inhalačnom kanáli nenachádza žiadne cudzie teleso.



2. Otvorte náustok tak, že pri súbežnom stláčaní dvoch zárezov ho vytiahnete smerom nahor.




3. Vyberte kapsulu Sirkavy z blistra (iba tesne pred použitím, pozrite zaobchádzanie s blistrom na konci návodu) a vložte ju do stredovej komory pomôcky NeumoHaler, ako je to znázornené na obrázku. Nie je dôležité, akým smerom je kapsula v komore uložená. Nikdy nekladajte kapsulu priamo do náustka.




4. Pevne zatvorte náustok, kým budete počuť kliknutie.




5. NeumoHaler uchopte tak, aby náustok smeroval nahor a len jedenkrát úplne zatlačte tlačidlo na prepichovanie kapsuly a uvoľnite ho. Tým sa urobia otvory v kapsule a umožnia uvoľnenie liečiva potrebného na vdýchnutie.



6. Úplne vydýchajte.
Dôležité: do náustka nikdy nedýchajte.




7. Vložte si NeumoHaler do úst a zovrite pery tesne okolo náustka. Hlavu držte rovno a pomaly a hlboko vdychujte, ale s takou intenzitou, aby ste počuli alebo cítili kapsulu vibrovať. Vdychujte, až kým nemáte plné pľúca, potom zadržte dych, pokiaľ vládžete a zároveň vytiahnite NeumoHaler z úst.
Zopakujte kroky 6 a 7 ešte raz, aby sa kapsula úplne vyprázdnila.



8. Opäť otvorte náustok. Vyberte použitú kapsulu a vyhod'te ju. Zatvorte náustok a nasad'te ochranný kryt. Uistite sa, že ochranný kryt je poriadne zavretý.


Čistenie pomôcky NeumoHaler

NeumoHaler čistite raz za mesiac.



1. Otvorte ochranný kryt a náustok.

Potom otvorte telo zatlačením trojuholníka vyrytého pod tlačidlom na prepichovanie kapsuly smerom nadol pomocou palca, ako je to znázornené na obrázku.




2. Opláchnite celý inhalátor teplou vodou tak, aby sa vymyli všetky zvyšky prášku. Dôkladne odsajte prebytočnú vodu z pomôcky NeumoHaler papierovou utierkou, a potom ju nechajte rozloženú dosušiť na vzduchu. Suší sa na vzduchu 24 hodín, preto ju vyčistite hneď po použití a tak bude pripravená na ďalšie použitie. Ak je potrebné, vonkajšiu stranu náustka očistite vlhkou, nie mokrou vreckovkou.


Zaobchádzanie s blistrom:



3. Odrhnete jeden blister pozdĺž perforácie (bodkovaných čiar).



4. Vezmite odtrhnutý blister a stiahnite ochrannú fóliu, až kým nie je vidieť kapsulu. Nepretláčajte kapsulu cez ochrannú fóliu.



5. Kapsuly sa musia vždy uchovávať v blistri a môžu sa vybrať len tesne pred použitím. Suchou rukou vyberte kapsulu z blistra.

Kapsulu nepreháťajte.

Sirkava kapsuly obsahujú iba malé množstvo prášku, teda kapsula je len čiastočne naplnená.

Výrobca pomôcky NeumoHaler:

Ferrer Internacional, S.A
Joan Buscallà 1-9
08173 Sant Cugat del Vallès
Španielsko

