

Písomná informácia pre používateľa

OxyNal 80 mg/40 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

oxykodónium-chlorid/naloxónium-chlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je OxyNal a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OxyNal
3. Ako užívať OxyNal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať OxyNal
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je OxyNal a na čo sa používa

Ako pôsobí OxyNal

OxyNal obsahuje **oxykodónium-chlorid** a **naloxónium-chlorid** ako liečivá **skombinované v jednej tablete**.

- Oxykodónium-chlorid je zodpovedný za bolesť potláčajúci účinok OxyNalu. Je to silné analgetikum (liek proti bolesti) zo skupiny opioidov.
- Naloxónium-chlorid je určený na pôsobenie proti zápche. Črevná dysfunkcia (napr. zápcha) je typickým vedľajším účinkom liečby opioidnými liekmi proti bolesti (ako je oxykodón).

OxyNal vám bol predpísaný na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá dostatočne zvládnuť len opioidnými analgetikami (silné analgetikum je silný liek proti bolesti). Naloxónium-chlorid sa pridáva proti zápche.

OxyNal je určený iba na použitie u dospelých.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OxyNal

NEUŽÍVAJTE OxyNal

- ak ste alergický na oxykodónium-chlorid, naloxónium-chlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak sa vám pri dýchaní nedostáva do pľúc dostatok kyslíka na odstránenie oxidu uhličitého, ktorý vzniká v tele pri dýchaní (respiračná depresia),
- ak máte závažné ochorenie pľúc spojené so zúžením dýchacích ciest (chronická obstrukčná choroba pľúc, CHOPC),
- ak máte stav známy ako *cor pulmonale*; pri tomto ochorení sa zväčšuje pravá strana srdca v dôsledku zvýšenia tlaku v krvnom riečisku pľúc a pod. (napr. ako dôsledok CHOPC – pozri višešie),
- ak máte závažnú bronchiálnu (prieduškovú) astmu,
- ak máte paralytický ileus (druh nepriechodnosti črev), ktorý nevyvolali opioidy,

- ak máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať OxyNal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- pri starších alebo oslabených pacientoch,
- ak máte paralytický ileus (druh nepriechodnosti črev), ktorý vyvolali opioidy,
- ak máte poruchu funkcie obličiek,
- ak máte miernu poruchu funkcie pečene,
- ak máte závažnú poruchu funkcie plúc (napr. znížená kapacita dýchania),
- ak máte myxedém (porucha funkcie štítnej žľazy so suchou, chladnou alebo opuchnutou kožou na tvári a končatinách),
- ak vaša štítna žľaza nevytvára dostatok hormónov (znížená činnosť štítnej žľazy alebo hypotyreoidizmus),
- ak vaše nadobličky nevytvárajú dostatok hormónov (adrenálna insuficiencia - nedostatočnosť nadobličiek alebo Addisonova choroba),
- ak máte duševné ochorenie sprevádzané (čiastočnou) stratou zmyslu pre realitu (psychóza) ako dôsledok otravy alkoholom alebo inými látkami (psychoaktívnymi látkami vyvolaná psychóza),
- ak máte problémy so žľcovými kameňmi,
- ak máte nadmerne zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty),
- ak máte zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída),
- ak máte nízky krvný tlak (hypotenzia),
- ak máte vysoký krvný tlak (hypertenzia),
- ak už máte srdcovocievne ochorenie,
- ak máte poranenú hlavu (kvôli riziku zvýšeného tlaku v mozgu),
- ak máte epilepsiu alebo sklon ku kŕcom,
- ak užívate aj inhibítory MAO (používajú sa pri liečbe depresie, Parkinsonovej choroby alebo liečbe bakteriálnych infekcií), alebo ste v posledných dvoch týždňoch užívali tento typ liekov, napr. lieky obsahujúce tranylcypromín, fenelzín, izokarboxazid, moklobemid a linezolid,
- ak máte nádorové ochorenie súvisiace s metastázami v pobrušnici alebo začínajúcu obstrukciu črev v pokročilých štádiach rakoviny tráviaceho traktu alebo panvy.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás z čokoľvek z hore uvedeného týka alebo ak sa ktorýkoľvek stav u vás v minulosti vyskytol. Povedzte tiež svojmu lekárovi, ak sa počas užívania OxyNalu u vás vyvinie ktorakoľvek z vyššie uvedených porúch. Najzávažnejším dôsledkom predávkovania opioidmi je respiračná depresia (pomalé a plytké dýchanie). Môže to tiež zapríčiniť pokles hladiny kyslíka, dôsledkom čoho môžu vzniknúť mdloby a podobne.

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Oxykodón/naloxón sa zatial neskúmal u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Jeho bezpečnosť a účinnosť nebola u detí a dospievajúcich preukázaná. Z tohto dôvodu sa používanie OxyNalu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neodporúča.

Počas užívania OxyNalu

• Poruchy dýchania súvisiace so spánkom

OxyNal môže spôsobiť poruchy dýchania súvisiace so spánkom, ako je spánkové apnoe (prestávky v dýchaní počas spánku) a hypoxémiu súvisiacu so spánkom (nízka hladina kyslíka v krvi). Príznaky môžu zahrňať prestávky v dýchaní počas spánku, nočné budenie v dôsledku dýchavičnosti, ťažkosti s udržaním spánku (prebúdzanie sa) alebo nadmernú ospalosť počas dňa. Ak vy alebo iná osoba spozorujete tieto príznaky, kontaktujte svojho lekára. Váš lekár môže zvážiť zníženie dávky.

• Hnačka

Ak dostanete na začiatku liečby silnú hnačku, môže to byť vyvolané účinkom naloxónu. Môže to byť prejav toho, že funkcia črev sa vracia do normálu. Takáto hnačka môže vzniknúť počas prvých 3-5 dní liečby. Pokial bude hnačka pretrvávať aj po 3-5 dňoch, alebo vás bude znepokojovať, vyhľadajte svojho lekára.

- **Abstinenčné príznaky**

Ak ste doteraz užívali iný opioid, môžu sa pri prechode na liečbu OxyNalom vyskytnúť príznaky z vysadenia (abstinenčné príznaky), napr. nepokoj, návaly potenia a bolesti svalov. Ak spozorujete takéto príznaky, možno budete musieť byť špeciálne sledovaný vašim lekárom.

- **Dlhodobé užívanie**

Ak sa liek užíva dlhodobo, môžete si voči OxyNalu vytvoriť návyk (toleranciu). To znamená, že na dosiahnutie požadovaného zmiernenia bolesti budete možno potrebovať vyššie dávky. Dlhodobé užívanie môže viesť tiež k fyzickej závislosti. Pri veľmi rýchлом ukončení liečby sa môžu objavíť abstinenčné príznaky (nepokoj, návaly potenia, bolestivosť svalov). Ak už liečbu nepotrebuje, mali by ste po konzultácii s lekárom dennú dávku znižovať postupne.

- **Plánovaná operácia**

Ak potrebujete podstúpiť operáciu, povedzte svojím lekárom, že užívate OxyNal.

- **Vplyv na tvorbu hormónov**

Podobne ako iné opioidy, oxykodón môže ovplyvňovať normálnu tvorbu hormónov v tele, ako je kortizol alebo pohlavné hormóny, najmä ak užívate dlhodobo vysoké dávky. Ak pocíťujete pretrvávajúce príznaky, ako sú pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (vrátane vracania), strata chuti do jedla, únava, slabosť, závrat, zmeny v menštruačnom cykle, impotencia, neplodnosť alebo znížený sexuálny pud, oznamte to svojmu lekárovi, keďže môže chcieť sledovať hladiny vašich hormónov.

- **Vplyv na citlivosť na bolest**

Tento liek môže zvýšiť vašu citlivosť na bolest, najmä pri vysokých dávkach. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa to stane. Môže byť potrebné zníženie dávky alebo zmena vášho lieku.

Tolerancia, závislosť a návykovosť

Tento liek obsahuje oxykodón, čo je opioidný liek. Opakované užívanie opioidných liekov proti bolesti môže mať za následok nižší účinok (vy si naň navyknete, čo je známe ako tolerancia). Opakované užívanie OxyNalu môže tiež viesť k závislosti, zneužívaniu a návykovosti, čo môže mať za následok život ohrozujúce predávkovanie. Riziko týchto vedľajších účinkov sa môže zvýšiť s vyššou dávkou a dlhším trvaním užívania.

Závislosť alebo návykovosť môžu spôsobiť pocit, že už nemáte kontrolu nad tým, kol'ko lieku musíte užiť alebo ako často ho musíte užiť. Môžete mať pocit, že musíte pokračovať v užívaní tohto lieku, aj keď už nepomáha zmierniť vašu bolest.

Riziko vzniku závislosti alebo návykovosti sa u jednotlivých osôb lísi. Môžete mať vyššie riziko, že sa stanete závislí alebo si navyknete na OxyNal, ak:

- vy alebo ktokoľvek z vašej rodiny ste niekedy zneužívali alebo ste boli závislí od alkoholu, liekov na predpis alebo nelegálnych drog („závislosť“),
- ste fajčiar,
- ste niekedy mali problémy s náladou (depresia, úzkosť alebo porucha osobnosti) alebo ste boli liečení psychiatrom na iné duševné choroby.

Ak si pri užívaní OxyNalu všimnete niektorý z nasledujúcich prejavov, môže by to byť znakom toho, že ste sa stali závislí alebo ste si navykli na liek.

- Potrebujete užívať liek dlhšie, ako to odporučil váš lekár.
- Potrebujete si vziať viac ako je odporúčaná dávka.
- Užívate tento liek z iných dôvodov, než pre aké vám bol predpísaný, napríklad aby ste zostali v pokoji alebo aby vám pomohol zaspáť.
- Urobili ste opakované, neúspešné pokusy o ukončenie alebo kontrolu užívania lieku.
- Keď prestanete užívať liek, cítite sa zle a budete sa cítiť lepšie, keď znova začnete užívať liek („abstinenčné účinky“).

Ak si všimnete niektorý z týchto prejavov, porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste sa poradili o najlepšom spôsobe liečby pre vás, vrátane toho, kedy je vhodné ukončiť liečbu a ako ju bezpečne ukončiť (pozri časť 3 „Ak prestanete užívať OxyNal“).

Nesprávne použitie a zneužitie OxyNalu

- Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky, ale nesmie sa lámat, žuvat ani drvit. Užitie rozlomených, rozžuvaných alebo rozdrvených tablet môže viesť k vstrebaniu potenciálne smrteľných dávok oxykodónium-chloridu (pozri časť 3. „Ak užijete viac OxyNalu, ako máte“).
- Samotné liečivo oxykodónium-chlorid má rovnaký potenciál na zneužívanie ako iné silné opioidy (silné analgetiká). OxyNal sa nemá nikdy zneužívať, zvlášť ak ste drogovo závislý. Ak ste závislý od látok ako heroín, morfín alebo metadón, zneužívanie OxyNalu povedie s vysokou pravdepodobnosťou k závažným abstinenčným príznakom, pretože obsahujú liečivo naloxón. Už existujúce abstinenčné príznaky sa môžu ešte zhoršiť.
- Nikdy nezneužívajte OxyNal tablety ich rozpúšťaním a injekčnou aplikáciou (napríklad do žily). Liek totiž obsahuje mastenec, ktorý môže zapríčiňať zničenie tkaniva v mieste podania (nekrózu) a vyvoláť zmeny v plúcnom tkanive (plúcne granulómy). Podobné zneužívanie môže mať aj ďalšie závažné následky a dokonca môže viesť až k úmrtiu.
- Užívanie OxyNalu môže spôsobiť pozitívny výsledok na antidopingových testoch. Užívanie OxyNalu ako dopingovej látky môže spôsobiť ohrozenie zdravia.
- OxyNal nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.

Iné lieky a OxyNal

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Antidepresíva

Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje, ak užívate lieky proti depresii (ako je citalopram, duloxetín, escitalopram, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín, venlafaxín). Tieto lieky môžu s oxykodónom vzájomne pôsobiť a môže sa stať, že sa u vás vyskytnú príznaky ako sú mimovoľné, rytmické stňahy svalov, vrátane svalov, ktoré ovládajú pohyb oka, nepokoj, nadmerné potenie, tras, zvýšenú pohotovosť reflexov, zvýšené svalové napätie, zvýšenie telesnej teploty nad 38°C. Ak sa u vás takéto príznaky vyskytnú, obráťte sa na svojho lekára.

Opioidy a sedatíva

Súbežné užívanie OxyNalu a sedatív, ako sú benzodiazepíny alebo podobné lieky, zvyšuje riziko ospalosti, tŕažkostí s dýchaním (útlm dýchania), kómy a môže byť život ohrozujúce. Z tohto dôvodu sa má súbežné užívanie zvážiť len v prípade, že nie sú k dispozícii iné možnosti liečby.

Ak vám však váš lekár predpíše OxyNal spolu so sedatívami, dávka a trvanie súbežnej liečby má byť vaším lekárom obmedzená.

Povedzte svojmu lekárovi o všetkých sedatívach, ktoré užívate, a presne dodržiavajte odporúčania svojho lekára týkajúce sa dávky. Môže byť užitočné informovať priateľov alebo príbuzných o prejavoch a príznakov uvedených vyššie. Obráťte sa na svojho lekára, ak máte nasledovné príznaky. Príklady sedatív a im podobných liekov zahŕňajú:

- iné silné lieky proti bolesti (opioidy);
- lieky na liečbu epilepsie, bolesti a úzkosti, ako je gabapentín a pregabalín;

- lieky na spánok a na upokojenie (sedatíva, vrátane benzodiazepínov, hypnotiká, anxiolytiká);
- lieky na liečbu depresie;
- lieky na liečbu alergií, cestovnej nevoľnosti alebo nevoľnosti (antihistaminiká alebo antiemetiká);
- lieky na liečbu psychických alebo mentálnych porúch (antipsychotiká ako sú fenotiazíny a neuroleptiká).

Iné lieky

Ak užívate tieto tablety súčasne s inými liekmi, účinok týchto tablet alebo iného lieku, ako je uvedené nižšie, môže byť zmenený. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

- lieky, ktoré znižujú zrážavosť krvi (deriváty kumarínu), čas zrážavosti sa môže zrýchliť alebo spomaliť;
- antibiotiká makrolidového typu (ako napr. klaritromycín, erytromycín alebo telitromycín);
- lieky proti plesniám azolového typu (ako napr. ketonazol, vorikonazol, itrakonazol alebo posakonazol);
- špecifický druh liekov známych ako inhibítory proteázy, používaných na liečbu HIV (príklady zahŕňajú ritonavir, indinavir, nelfinavir alebo sakvinavir);
- cimetidín (liečivo na žalúdočné vredy, poruchy trávenia a pálenie záhy);
- rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy);
- karbamazepín (používanýna liečbu záchvatov, kŕčov a určitých bolestivých stavov);
- fenytoín (používaný na liečbu záchvatov a kŕčov);
- rastlinný liek z ľubovníka bodkovaného (známy tiež ako *Hypericum perforatum*);
- chinidín (liečivo na liečbu nepravidelného srdcového tepu).

Medzi OxyNalom a paracetamolom, kyselinou acetyl salicylovou alebo naltrexónom sa nepredpokladajú žiadne interakcie.

OxyNal a jedlo, nápoje a alkohol

Požívanie alkoholu počas užívania OxyNalu môže u vás vyvolat väčšiu ospalosť alebo zvýšiť riziko závažných vedľajších účinkov, ako je plytké dýchanie s rizikom zastavenia dýchania a straty vedomia. Počas užívania OxyNalu sa neodporúča piť alkohol.

Počas užívania OxyNalu sa vyhýbajte pitiu grapefruitového džusu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa užívaniu OxyNalu, ako je to len možné. Ak sa oxykodónium-chlorid počas tehotenstva užíva dlhšiu dobu, môže to viesť k abstinencičným príznakom u novorodencov. Ak sa oxykodónium-chlorid podá počas pôrodu, môže u novorodenca vzniknúť respiračná depresia (pomalé a plytké dýchanie).

Dojčenie

Počas liečby OxyNalom sa má dojčenie ukončiť. Oxykodónium-chlorid prechádza do materského mlieka. Nie je známe, či aj naloxónium-chlorid prechádza do materského mlieka. U dojčiat sa preto nedá vylúčiť riziko jeho príjmu, zvlášť pri užívaní opakovanych dávok OxyNalu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

OxyNal môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pravdepodobné to je hlavne na začiatku liečby OxyNalom, po zvýšení dávky alebo po zmene liečby z iného lieku. Ak však už budete na stabilnej dávke, tieto vedľajšie účinky vymiznú.

Poradte sa so svojím lekárom, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

OxyNal obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať OxyNal

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred začatím liečby a pravidelne počas liečby, lekár s vami bude hovoriť o tom, čo môžete očakávať od užívania OxyNalu, kedy a ako dlho ho musíte užívať, kedy máte kontaktovať svojho lekára a kedy máte ukončiť užívanie lieku (pozri tiež „Ak prestanete užívať OxyNal“).

Dávkovanie

Váš lekár rozhodne, koľko OxyNalu máte užívať každý deň a ako rozdeliť celkovú dennú dávku na ranné a večerné dávky.

Váš lekár tiež rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách dávky počas liečby.

Vaša dávka sa upraví podľa stupňa bolesti a individuálnej citlivosti. Máte dostávať najnižšiu dávku potrebnú na potlačenie bolesti. Ak ste sa už liečili inými opioidmi, liečba OxyNalom sa môže začať vyššou dávkou.

Maximálna denná dávka je 160 mg oxykodónium-chloridu a 80 mg naloxónium-chloridu. Ak potrebujete vyššiu dávku, váš lekár vám môže dať ďalší oxykodónium-chlorid bez naloxónium-chloridu. Avšak maximálna denná dávka oxykodónium-chloridu nemá prekročiť 400 mg. Prospešný účinok naloxónium-chloridu na črevnú aktivitu môže byť ovplyvnený, ak sa ďalší oxykodónium-chlorid podáva bez dodatočného naloxónium-chloridu.

Ak prechádzate z OxyNalu na liečbu iným opioidným liekom proti bolesti, pravdepodobne sa vám zhorší činnosť čriev.

Ak cítite bolesť medzi dvoma dávkami OxyNalu, budete potrebovať rýchle pôsobiaci liek proti bolesti. OxyNal na to nie je vhodný. V takom prípade sa obráťte na svojho lekára.

Ak máte pocit, že je účinok OxyNalu priveľmi silný alebo priveľmi slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Starší pacienti

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek a/alebo pečene nie je spravidla potrebná úprava dávkovania.

Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo miernu poruchu funkcie pečene, váš lekár bude pri predpisovaní OxyNalu zvlášť opatrny. Ak máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene, OxyNal nesmiete užívať (pozri časť 2 „NEUŽÍVAJTE OxyNal“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Deti a dospevajúci do 18 rokov

Podávanie OxyNalu deťom a dospevajúcim do 18 rokov sa neodporúča.

Spôsob podávania

OxyNal je na vnútorné použitie (cez ústa) a užíva sa s jedlom alebo bez jedla.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky (cez deliacu ryhu). Tableta sa nesmie ďalej lámať, žuvat' ani drviť. Užitie rozlomených, rozžuvaných alebo rozdrvených tabliet môže viest' k vstrebaniu potenciálne smrteľných dávok oxykodónium-chloridu (pozri časť 3. "Ak užijete viac OxyNalu, ako máte").

OxyNal užívajte každých 12 hodín, podľa pevnej časovej schémy (napr. o 8. hodine ráno a o 20. hodine večer) s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody).

OxyNal sú tablety s predĺženým uvoľňovaním, čo znamená, že sa liečivá uvoľňujú dlhší čas. Ich účinok trvá 12 hodín.

Dĺžka užívania

OxyNal sa spravidla nemá užívať dlhšie, ako je to potrebné. Ak sa OxyNalom liečite dlhodobo, váš lekár má pravidelne kontrolovať, či ešte potrebujete užívať OxyNal.

Ak užijete viac OxyNalu, ako máte

Ak užijete viac tablet, ako je predpísaná dávka, musíte svojho lekára ihned informovať.

Dôsledkom predávkovania môže byť:

- zúžené zreničky,
- pomalé a plytké dýchanie (respiračná depresia),
- ospalosť hraničiaca s bezvedomím,
- znížené svalové napätie (hypotónia),
- spomalenosť pulzu
- pokles krvného tlaku
- porucha mozgu (známa ako toxická leukoencefalopatia)

V závažných prípadoch môže nastať strata vedomia (kóma), môže sa vyskytnúť voda v plúcach a kolaps krvného obehu, čo môže v niektorých prípadoch viest' k úmrtiu.

Vyhýbajte sa situáciám vyžadujúcim vysokú úroveň sústredenia, napr. vedenie vozidiel.

Ak zabudnete užiť OxyNal

Alebo ak užijete nižšiu ako predpísanú dávku, nemusíte pocítiť žiadny účinok.

Ak zabudnete užiť svoju dávku, riadte sa nasledujúcimi pokynmi:

- Ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť o 8 a viac hodín: užite ihned zabudnutú dávku a pokračujte podľa vašej normálnej schémy dávkowania.
- Ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť o menej ako 8 hodín: užite zabudnutú dávku a potom počkajte ďalších 8 hodín do ďalšej dávky. Snažte sa dostať späť do pôvodného rozpisu dávkowania (napr. o 8. hodine ráno a o 20. hodine večer). Neužívajte viac ako jednu dávku v priebehu 8 hodín.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať OxyNal

Neprerušujte liečbu bez toho, aby ste informovali svojho lekára.

Ak už nepotrebuješ ďalšiu liečbu, musíte po konzultácii so svojím lekárom znižovať dennú dávku postupne. Týmto spôsobom sa vyhnete abstinenčným príznakom, ako je nepokoj, návaly potenia a bolestivosť svalov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo robiť, keď sa u vás objavia:

Ak sa u vás objaví niektorý závažný vedľajší účinok, **ihned sa obráťte na najbližšieho lekára:**

- Hlavným nebezpečenstvom predávkovania opioidmi je pomalé a plytké dýchanie (respiračná depresia). Dochádza k nemu väčšinou u starších a oslabených (slabých) pacientov. Opioidy môžu tiež spôsobiť závažný pokles krvného tlaku u citlivých pacientov.

Ostatné možné vedľajšie účinky

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- bolest' brucha
- zápcha
- hnačka
- sucho v ústach
- poruchy trávenia
- vracanie (nevoľnosť)
- pocit nevoľnosti
- nadúvanie (vetry)
- znížená chuť do jedla až strata chuti
- pocit závratu alebo točenia hlavy
- bolest' hlavy
- návaly horúčavy
- pocit neobvyklej slabosti
- únavu alebo vyčerpanosť
- svrbenie kože
- kožné reakcie/vyrážka
- potenie
- závrat (vertigo)
- ťažkosti so spánkom
- ospalosť

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- nadúvanie brucha
- nezvyčajné myšlienky
- úzkosť
- zmätenosť
- depresia
- nervozita
- zvieravá bolesť na hrudi, zvlášť, ak už máte ischemickú chorobu srdca
- pokles krvného tlaku
- abstinenčné príznaky ako rozrušenie (nepokoj)
- mdloba
- nedostatok energie
- smäd
- zmeny chuti
- búšenie srdca
- žlčová kolika
- bolest' na hrudi
- celkový pocit choroby
- bolest'
- opuchy rúk, členkov alebo nôh
- neschopnosť sústrediť sa

- poruchy reči
- tras
- ťažkosti s dýchaním
- nepokoj
- zimnica
- zvýšenie hladiny pečeňových enzymov
- zvýšenie krvného tlaku
- znížený sexuálny pud
- nádcha
- kašeľ
- precitlivenosť/alergické reakcie
- úbytok telesnej hmotnosti
- zranenia v dôsledku nehôd
- zvýšená potreba močenia
- svalové kŕče
- svalové zášklby
- bolest' svalov
- porucha zraku
- epileptické záchvaty (hlavne u osôb s epilepsiou alebo so sklonom k záchvatom)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- zrýchlenie tepovej frekvencie
- závislosť od lieku
- zmeny na Zuboch
- prírastok telesnej hmotnosti
- zívanie

Neznáme (časť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- euforická nálada
- závažná ospalosť
- poruchy erekcie
- nočné mory
- halucinácie
- plytké dýchanie
- ťažkosti pri močení
- agresivita
- trpnutie kože (mravčenie)
- grganie
- problémy s dýchaním počas spánku (syndróm spánkového apnoe), pre viac informácií pozri časť 2 "Upozornenia a opatrenia"

Liečivo oxykódónium-chlorid (ak sa užíva samotné), má ďalšie nasledovné vedľajšie účinky:

Oxykodón môže vyvoláť ťažkosti s dýchaním (respiračná depresia), zúženie zreničiek, kŕče svalstva predušiek a kŕče hladkého svalstva, ako aj potlačenie kašľového reflexu.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- zmeny nálad a osobnosti (napr. depresie, pocit extrémneho šťastia)
- znížená/zvýšená aktivita
- ťažkosti pri močení
- čkanie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- poruchy koncentrácie
- migrény

- zvýšené svalové napätie
- mimovoľné sťahy svalov
- stav, keď črevá prestanú správne fungovať (nepriechodnosť črev)
- suchá koža
- tolerancia (znášanlivosť) lieku
- znížená citlivosť na bolest' alebo dotyk
- poruchy s koordináciou
- zmeny hlasu (dysfónia)
- zadržiavanie vody
- poruchy sluchu
- vredy v ústach
- problémy s prehlitaním
- bolestivé d'asná
- poruchy vnímania (napr. halucinácie, pocit nereálnosti okolia)
- sčervenanie kože
- dehydratácia
- nepokoj
- pokles hladiny pohlavných hormónov môže ovplyvniť množstvo spermí u mužov a menštruačný cyklus u žien

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- svrbiaca vyrážka (žihľavka)
- infekcie ako je opar alebo herpes (ktoré môžu spôsobiť pľuzgiere v oblasti úst alebo genitálií)
- zvýšená chut' do jedla
- čierna (smolnatá) stolica
- krvácanie z d'asien

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- akútne celkové alergické reakcie (anafylaktické reakcie)
- zvýšená citlivosť na bolest'
- chýbajúca menštruácia
- novorodenecký abstinencný syndróm
- problémy so žlčou
- zubný kaz

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať OxyNal

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Tento liek uchovávajte v bezpečne uzamknutom a zabezpečenom skladovacom priestore, kam iní ľudia nemajú prístup. Ľuďom môže závažne uškodiť a byť fatálny (smrteľne nebezpečný) pre ľudí, ktorým neboli predpísaný.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku a na blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OxyNal obsahuje

Liečivá sú oxykodónium-chlorid a naloxónium-chlorid.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 80 mg oxykodónium-chloridu, čo zodpovedá 72 mg oxykodónu a 40 mg naloxónium-chloridu, ako 43,6 mg dihydrátu naloxónium-chloridu, čo zodpovedá 36 mg naloxónu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

Polyvinylacetát, povidón, laurylsíran sodný, koloidný bezvodý oxid kremičitý, stearát horečnatý.

Obal tablety

Polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá OxyNal a obsah balenia

Červené, podlhovasté, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s deliacimi ryhami na oboch stranach, s dĺžkou 16 mm, šírkou 7,5 mm a výškou 4,6 – 5,6 mm.

OxyNal 80 mg/40 mg je balený v ALU/PVC/PE/PVDC detských bezpečnostných blistroch obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tablet s predĺženým uvoľňovaním.

OxyNal 80 mg/40 mg je balený v ALU/PVC/PE/PVDC perforovaných, detských bezpečnostných blistroch s jednotlivými dávkami obsahujúcich 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletu s predĺženým uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Výrobca

Develco Pharma GmbH, Grienmatt 27, 79650 Schopfheim, Nemecko

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Česká republika

Oxynalon

Dánsko

Oxycodone/Naloxone Stada 80 mg/40 mg

Fínsko

Oxycodone/Naloxone STADA 80 mg/40 mg depottabletti

Nemecko

Oxycodon/Naloxon STADA 80 mg/40 mg Retardtabletten

Slovensko

OxyNal 80 mg/40 mg

Švédsko

Oxycodone/Naloxone STADA 80 mg/40 mg depottabletter

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2024.